

# بررسی نقش اقلیم (۶) فرآیندهای هوازدگی سنگ‌ها براساس مدل‌های پلتیر در ایران

علی حنفی

دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی دانشگاه اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

مکان مناسب برای استقرار و زندگی به مناطق کوهستانی و پایکوهی پناه برده و مراکز سکونتی خویش را دایر کرده است. ولی به مرور زمان سنگ‌هایی که در سطح زمین یا نزدیکی آن قرار دارند، در اثر عواملی مانند هوازدگی، یکارچگی خود را از دست می‌دهند و متلاشی می‌شوند (معماریان، ۱۳۷۹، ۵۲). هوازدگی زمانی رخ می‌دهد که سنگ‌های سطحی زمین در اثر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی شکسته و یا تغییر شکل می‌دهند که این عمل می‌تواند توسط باد، آب و یا اقلیم صورت گیرد (ربیع، ۱۹۵۰<sup>(۱)</sup>). مدل‌های لویس پلتیر<sup>(۲)</sup> در مورد ژئومورفوولوژی اقلیمی به عنوان بهترین منبع در مورد فرایندهای هوازدگی می‌باشد که زمین شناسان و ژئومورفوولوژیست‌ها و دیگر علوم مربوطه از آن برای شناسایی و تفسیر اشکال سطح زمین استفاده می‌کنند (غاولر و پیترسون، ۲۰۰۳<sup>(۳)</sup>، ۵). متوسط دمای سالانه و متوسط بارش سالانه دو متغیری هستند که در هوازدگی نقش عمده‌ای دارند و می‌توانند در شناسایی رژیم‌های هوازدگی مورد استفاده قرار گیرند. پلتیر با استفاده از این دو متغیر هفت مدل را مشخص کرد که می‌توانند انواع مختلف پدیده‌های هوازدگی را توصیف کنند. آنها عبارتند از: هوازدگی شیمیایی، فعالیت یخبندان، رژیم‌های هوازدگی، فرسایش بارانی، حرکات توده‌ای مواد، فعالیت باد و رژیم‌های مورفوژنتیک (پلتیر، ۱۳۵۰، ۲۳۴-۲۳۶). هوازدگی شیمیایی در مکان‌هایی رخ می‌دهد که دارای آب و دمای بالایی می‌باشند، مدل به نحوی طراحی شده که مرتبط‌ترین و گرم‌ترین مناطق دارای حداقل هوازدگی شیمیایی و خشک‌ترین و سردترین مناطق دارای حداقل هوازدگی شیمیایی می‌باشند. فعالیت یخبندان (هوازدگی فیزیکی) در مناطق با دمای‌های بسیار پایین که هوازدگی مکانیکی بر هوازدگی شیمیایی ارجحیت دارد، رخ می‌دهد (غاولر و پیترسون، ۲۰۰۳، ۴).

هوازدگی فیزیکی نوعی از هوازدگی شامل تنشهای زمین‌شناسی، فشارهای همه جانبه تکتونیکی، تنشهای ناشی از تابش خورشید و یخ زدن سریع آب می‌باشد. تنشهای زمین‌شناسی وقتی به وجود می‌آیند که سنگ‌های بلور لایه (گرانیت و مرمر) متبلور شوند یا تبلور دوباره یابند و یا سنگ‌های رسوبی (مثل ماسه سنگ‌های توده‌ای سست و به هم پیوسته، آركوز و آهک) تحت فشارهای همه جانبه تکتونیکی زیاد یا تحت فشار فوق العاده لایه‌های بالایی پدیده سنگ شدگی را تحمل کنند. فرسایش سطحی و کم شدن بار باعث کم شدن فشار بر آن و ایجاد شبکه‌ای از درزها و ترک‌ها می‌شود. سرعت هوازدگی با عواملی همچون میزان آب وارد شده به توده هوازده و آبی که از آن خارج می‌گردد، ترکیب شیمیایی آب، مواد آلی یا ارگانیک تنظیم می‌گردد. افزایش درجه حرارت به میزان ۱۰ درجه سرعت واکنش‌های شیمیایی را دو برابر می‌کند (قریب، ۱۳۸۲، ۱۰۷). هوازدگی


هوازدگی زمانی رخ می‌دهد که سنگ‌های سطحی زمین در اثر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی شکسته و یا تغییر شکل می‌دهند. این عمل می‌تواند توسط باد، آب، اقلیم، عوامل گیاهی و جانوری صورت گیرد. این مطالعه براساس مدل‌های لویس پلتیر انجام شده که در این مدل‌ها از دو متغیر متوسط دما و بارش سالانه استفاده گردیده است. پلتیر با استفاده از این دو متغیر هفت مدل را مشخص کرد که می‌توانند انواع مختلف پدیده‌های هوازدگی را توصیف کنند. ازین این مدل‌ها دو مدل مربوط به رژیم‌های هوازدگی و رژیم‌های مورفوژنتیکی در مورد کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته و رژیم‌های مربوط به هر استگاه از روی نمودارهای مربوطه تعیین گردید. به منظور مطالعه و بررسی وضعیت هوازدگی و مناطق ژئومورفوولوژیکی در سطح کشور، داده‌های اقلیمی شامل میانگین بارش و دمای سالانه ۱۴۳ استگاه سیتوپتیک که دارای داده و طول دوره آماری مناسب بودند از سایت سازمان هواشناسی اخذ گردیده و در یک پایگاه داده در محیط GIS ثبت گردید. در ادامه بعد از بررسی روند دما و بارش در کشور، رژیم‌های مربوط به هر استگاه از روی مدل‌های پلتیر تعیین و بعد از دادن ارزش وزنی به آنها در پایگاه داده مربوطه ثبت گردیده و سپس نفشه‌های مربوطه در محیط Arcmap تولید گردید. نتایج حاصل نشان داد که از نه وضعیت مورفوژنتیکی موجود در مدل پلتیر، پنج وضعیت در شرایط اقلیمی ایران اتفاق می‌افتد به طوری که بیشتر بخش‌های واقع در فلات مرکزی، شرق و جنوب کشور در منطقه خشک، مناطق کوهستانی کشور، ارتفاعات زاگرس و البرز دارای رژیم نیمه خشک، استگاه‌های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر و دامنه‌های غربی زاگرس دارای رژیم متعال و ساوان می‌باشند. از نظر وضعیت هوازدگی نیز مناطق واقع در فلات مرکزی و جنوب کشور دارای هوازدگی خیلی کم، مناطق کوهستانی کشور مثل ارتفاعات زاگرس، البرز و شمال غرب دارای هوازدگی مکانیکی در سطح ضعیف، در برخی از استگاه‌های واقع در دامنه‌های شمالی البرز و دامنه‌های غربی زاگرس هوازدگی شیمیایی همراه با عمل یخبندان تا هوازدگی شیمیایی متوسط و در چند استگاه واقع در سواحل جنوبی دریای خزر هوازدگی شیمیایی در سطح شدید رخ می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: اقلیم، هوازدگی، مدل‌های پلتیر، ایران، مورفوژنتیک، سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقدمه

از زمان‌های دور سنگ نماد پایداری و استحکام بوده و انسان در انتخاب

ناهمراري، سکونتگاه‌های واقع در پای اين ارتفاعات را تهدید می‌کند. کرمي (۱۳۸۱) به بررسی مسائل ژئومورفولوژي در دامنه‌های شمالی بزقوش و دشت انباشتی سراب پرداخته است. دلال اوغلی (۱۳۸۱، ۴۲) در تحقیقی پیرامون سیستم‌های مورفوژنر در دامنه‌های شمالی سبلان، ضمن تشخیص اقلیم بسیار سرد در ارتفاعات منطقه، از اشکال حاصل از فعالیت سیستم‌های فرسایش پریگلاسیر به تشکیل واریزه‌های جدید و تراکم آنها در پای دامنه‌ها به شکل مخروطه‌های واریزه‌ای اشاره نموده و پیدايش آنها را مدیون عوامل هوازدگی ناشی از یخ‌زدگی و ذوب مجدد یخ می‌داند. کرمي (۱۳۸۳) به بررسی فرایندهای هوازدگی و تأثیر آنها بر مناطق شهری و روستایی شمال غرب ایران (منطقه آذربایجان) پرداخته و نقشه پهن‌بندی هوازدگی را برای منطقه ارائه داده است. با توجه به کمبودهایی که در کشور ما در مورد مطالعات ژئومورفولوژيکی بويژه فرایندهای هوازدگی وجود دارد، اين پژوهش سعی دارد ضمن بررسی فرایندهای هوازدگی و مورفوژنتیکی در ایران به طبقه بندی مناطق هوازده و مورفوژنتیکی کشور براساس متغیرهای اقلیمی پرداخته و در نهایت نقشه جامعی از نوع اين فرایندها در کشور ارائه دهد.




**نگاره ۱: توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های سینوپتیک کشور**

## مواد و روش‌ها

به منظور بررسی وضعیت هوازدگی و اشکال مورفوژنتیکی مربوطه در سطح کشور، داده‌های عناصر اقلیمی مانند متوسط دما و بارش سالانه ایستگاه‌های سینوپتیک کشور در دوره آماری ۳۰ ساله از سایت سازمان هواشناسی اخذ گردید. بعد از رفع نواقص آماری از بین کلیه ایستگاه‌های سینوپتیک کشور، ۱۴۳ ایستگاه که داده‌های مناسبی از لحاظ طول دوره آماری داشتند، انتخاب گردید. سپس یک پایگاه داده‌ای در محیط ArcGIS ایجاد گردید و داده‌های مربوطه در آن محیط ثبت گردید. در ادامه تجزیه و تحلیل‌ها در محیط ArcMAP صورت گرفته و نقشه‌های گوناگون ترسیم گردید. نگاره (۱) توپوگرافی کشور و موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های مربوطه را نشان می‌دهد. برای شناسایی وضعیت هوازدگی در سطح کشور از مدل‌های پلتیر استفاده گردید و از بین هفت مدل پلتیر، دو مورد که به نحو مطلوبی می‌توانند وضعیت هوازدگی و اشکال مربوطه را توصیف کنند مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتند از:

به عوامل مختلفی بستگی دارد، عمدترين آنها شرایط آب و هوایی و ترکیب فیزیکی و شیمیایی سنگ مادر می‌باشد (سلبای<sup>(۶)</sup> ۱۹۹۳). بر حسب قلمرو آب و هوایی، نوع سنگ‌ها و ویژگی آنها، متلاشی شدن سنگ‌های سخت و متصل دامنه‌ها ثبات ناحیه را مورد تهدید قرار می‌دهد (رجائی، ۱۳۷۳، ۲۶۰). مطالعات مربوط به هوازدگی از یکسو به علت کندی عمل فرایندها، به زمان زیادی نیاز دارند و از سوی دیگر بیش از یک فرایند در یک مکان فعال است و اغلب نمی‌توان مطمئن بود که اشکال حاصله نتیجه کدام فرایند ویژه است. بنابراین در یک ربع قرن اخیر مطالعات مربوط به هوازدگی در شبیه‌سازی آزمایشگاهی متتمرکز شده است تا به این ترتیب اثرات فرایندهای هوازدگی به طور مجزا تحت شرایط کنترل شده، مطالعه شوند و سپس نتایج با شرایط طبیعی مقایسه گردد (راینسون<sup>(۷)</sup> ۲۰۰۰). برای مثال مورتون و همکاران<sup>(۸)</sup> (۱۳۸۳) با آزمایش تئوری یک فرایند بوسیله شبیه سازی آزمایشگاهی، نتایج حاصل را با آنچه که در طبیعت رخ می‌دهد، مقایسه کردد (به تقلیل از کرمی، ۱۳۸۳). قابل ذکر است که ژئومورفولوژیست‌ها در سال‌های اخیر، با استفاده از وسایل آزمایشگاهی مجهز در زمینه مطالعات کاربردی مربوط به هوازدگی طبیعی سنگ‌های مورد استفاده در ساخت بناها، مشارکت خوبی داشته‌اند. فاولر و پترسون (۲۰۰۳) مدل‌های هفت گانه اقلیمی، هوازدگی و فرسایش پلتیر را با استفاده از نرم افزار GIS در مورد کشور آمریکا بکار برد و این کشور را از لحاظ مناطق مختلف هوازده و فرسایش طبقه‌بندی کردن. پلتیر (۱۹۵۰) به بررسی چرخه جغرافیایی در رژیم‌های یخچالی در ارتباط با ژئومورفولوژی اقلیمی پرداخته است. بوچارد و جولیکور<sup>(۹)</sup> (۲۰۰۰) به مطالعه هوازدگی شبیه‌سازی در ارتباط با یافته‌های ژئومورفولوژیکی در جنوب شرق کانادا پرداخته‌اند. گریگوری<sup>(۱۰)</sup> و همکاران (۱۳۸-۶۴، ۱۹۹۵) مدل ادرارکی جدیدی برای درک تغییرات جغرافیایی هوازدگی ارائه کردن. آنها در ارائه این مدل از مدل‌های پلتیر در مورد هوازدگی استفاده کردن. اورده و ساربوان<sup>(۱۱)</sup> (۱۹۹۵) برخی پارامترهای مورفوافقیمی را در منطقه کارپاپین رومانی براساس مدل‌های پلتیر مورد بررسی قرار داده‌اند. موقعیت جغرافیایی ایران در سطح کره زمین، پراکندگی و استقرار بسیاری از روستاهای و شهرها در پهنه‌های پر خطر زلزله یا دامنه‌های لغزشی و غیره، اغلب سکونتگاه‌های انسانی را در معرض پدیده‌های مخاطره آمیز طبیعی قرار می‌دهد (افراحته، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷). بنابراین در کشور ایران، بیشتر مطالعات ژئومورفولوژیکی مربوط به فرایندهای هوازدگی به سمت سیستم‌های مورفوژنر فعال در مناطق کوهستانی و مخاطرات مورفوژنتیکی ناشی از آن معطوف شده و با وجودی که در سال‌های اخیر، پژوهش‌های علمی متعددی، با توجه به تکنگاه‌های زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی موجود در نواحی شهری و روستایی، در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمرانی انجام شده تشدید عوامل موفرژنر و قوع انواع مخاطرات مانند تخریب توده‌ای مواد دامنه‌ای پس از اجرای طرح‌ها، نیاز به مطالعات جامع و دقیق را در این زمینه نشان می‌دهد. خیام (۱۳۷۴، ۹۶) در مطالعه‌ای پیرامون تنگناهای ژئومورفولوژیکی توسعه شهر تبریز، با معرفی ارتفاعات شمالی تبریز به عنوان یکی از تنگناهای موفرولوژیکی دشت تبریز، برای گسترش منطقی، یادآور می‌شود که وقوع پدیده‌های کریوکلاستی و ترموكلاستی در ماسه سنگ‌ها و شیسته‌های این




جدول (۱): مناطق مورفوژنتیکی براساس تقسیم‌بندی پلتیر (۱۹۵۰)

منطقه مورفوژنتیکی	دماه سالانه	میانگین بارش سالانه	ویژگی‌های مورفوژنتیکی
یخچالی	-۷ تا -۱۸	۱۴۰۰	فرسایش یخچالی، نیواسیون
مجاور یخچالی	-۱ تا -۱۵	۱۴۰۰	تأثیر باد، حرکات توده‌ای شدید، فعالیت آب جاری ضعیف
بوریل	-۹ تا +۳	۱۵۲۰	تأثیر یخنده‌دان متوسط، تأثیر آب و باد متوسط تا ضعیف
اقیانوسی	+۲ تا +۲۱	۱۹۰۰	حرکات توده‌ای شدید، فعالیت آب جاری متوسط تا ضعیف
سلوا	+۱۶ تا +۲۹	۲۲۹۰	حرکات توده‌ای شدید، شستشوی دامنه‌ها در حد کم
معتدل	+۳ تا +۲۹	۱۵۲۰	فعالیت آب جاری حداکثر، تأثیر یخنده‌دان و باد در حد کم
ساوان	-۱۲ تا +۲۹	۱۲۷۰	فعالیت آب جاری شدید تا ضعیف، تأثیر باد متوسط
نیمه خشک	+۲ تا +۲۹	۶۴۰ تا ۲۵۰	تأثیر باد شدید، فعالیت آب جاری متوسط تا شدید
خشک	+۱۳ تا +۲۹	۳۸۰	تأثیر باد شدید، فعالیت آب جاری و حرکات توده‌ای ضعیف


### یافته‌های تحقیق

سنگ‌ها به ازای کانی‌های سازنده آنها، بافت و ساخت سنگ، در مقابل هوازدگی مقاومت‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند (معماریان، ۱۳۷۹، ۲۲۷). از طرف دیگر تغییر دما از طریق پدیده‌های کربوکلاستی و ترمکلاستی و رطوبت بوسیله پدیده‌های هیدروکلاستی و هالوکلاستی اثرات مهمی را در پی داردند (رجایی، ۱۳۷۳، ۱۰۶). کشور ایران از نقطه نظر بارش با توجه به گستردگی از لحاظ عرض جغرافیایی و وجود ارتفاعات در جهت‌های مختلف متنوع است. همانطور که در نگاره (۴) دیده می‌شود، دو بیشینه بارش در کشور وجود دارد که یکی در سواحل دریای خزر و دیگری در دامنه‌های غربی زاگرس قرار گرفته است، در حالی که کمینه بارش در فلات مرکزی و جنوب شرقی کشور دیده می‌شود. وضعیت دمایی کشور نیز بسیار متنوع است به طوری که کمینه‌های دما بیشتر در شمال غرب و ارتفاعات زاگرس و البرز دیده می‌شود، در حالی که بیشینه‌های دما در سواحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد (نگاره ۵). بعد از بدست آوردن نگرش کلی از روند دما و بارش، کشور ایران از لحاظ وضعیت مناطق مورفوژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از تعیین محل هر یک از ایستگاه‌ها در مدل پلتیر وضعیت مربوط به هر ایستگاه در پایگاه داده وارد گردیده و مشخص شد که از نه وضعیت مورفوژنتیکی موجود در مدل پلتیر، پنج وضعیت در شرایط اقلیمی ایران رخ می‌دهد. در ادامه برای پنهانه‌بندی این مناطق در محیط GIS سعی شد تا از روش‌های موجود برای درونیابی فضایی و تحلیل فضایی داده‌های مکانی، از مدل میان‌یابی وزن دهی معکوس (IDW) استفاده شود. در این مدل در یک سطح میان‌یابی اثر یک پارامتر بر نقاط اطراف یکسان نبوده و نقاط نزدیک بیشتر و نقاط دور کمتر تحت تأثیراند و هر چه فاصله از مبدأ افزایش یابد، اثر کمتر خواهد شد و نیز

الف) رژیم‌های هوازدگی  
رژیم‌های هوازدگی در نگاره (۲) نشان داده شده است. در این مدل از هفت طبقه تقسیم‌بندی شده است به طوری که هر ناحیه نشان دهنده یک نوع شرایط هوازدگی می‌باشد. این مدل به نحوی طراحی شده که مرتبط‌ترین و گرتمترین مناطق دارای حداکثر هوازدگی شیمیایی و خشک‌ترین و سردترین مناطق دارای حداقل هوازدگی شیمیایی می‌باشند. فعالیت یخنده‌دان (هوازدگی فیزیکی) در مناطق با دمای‌های بسیار پایین که هوازدگی مکانیکی بر هوازدگی شیمیایی ارجحیت دارد رخ می‌دهد.



نگاره ۱: تقسیم‌بندی رژیم‌های هوازدگی در گراف پلتیر (۱۹۵۰)




نگاره ۲: مناطق مورفوژنتیکی براساس تقسیم‌بندی پلتیر


ب) مناطق مورفوژنتیکی  
مدل رژیم‌های مورفوژنتیکی که بیشتر شیوه یک طبقه‌بندی اقلیمی و گیاهی است تا مدل هوازدگی، در نگاره (۳) نشان داده شده است. در این مدل نیز از دو متغیر متوسط دما و بارش سالانه استفاده گردیده و مناطق مورفوژنتیکی به نه طبقه مختلف تقسیم شده است. مناطق دارای دمای‌های پایین عمدتاً جزو مناطق یخچالی و مناطق با دمای‌های بالا و بارش کم جزو مناطق خشک و نیمه خشک و مناطق دارای بارش‌ها و دمای‌های بالا جزو مناطق معتدل و سلوا محسوب می‌شوند. جدول (۱) مناطق مورفوژنتیکی را براساس تقسیم‌بندی پلتیر به همراه ویژگی‌های مورفوژنتیکی آنها نشان می‌دهد.

## جدول ۲ : نوع و شدت هوازدگی و مقادیر وزنی آنها


مقادیر وزنی	نوع و شدت هوازدگی
۱	هوازدگی خیلی کم
۲	هوازدگی مکانیکی ضعیف
۳	هوازدگی شیمیایی ضعیف با عمل یخبدان
۴	هوازدگی شیمیایی متوسط
۵	هوازدگی شیمیایی شدید



نگاره ۵: پهنه‌بندی میانگین دمای ایستگاه‌های سینوپتیک کشور (دوره آماری ۱۹۷۶-۲۰۰۵)




نگاره ۶: مناطق مورفوژنتیکی براساس تقسیم‌بندی پلتیر در ایران (دوره آماری ۱۹۷۶-۲۰۰۵)




نگاره ۷: طبقه‌بندی نوع و شدت هوازدگی براساس مدل پلتیر در سطح کشور (دوره آماری ۱۹۷۶-۲۰۰۵)

به هر وضعیت یک ضریب از ۱ تا ۵ داده شد، به طوری که کمترین ضریب به مناطق خشک و بیشترین آن به مناطق اقیانوسی تعلق گرفت. در نهایت نقشه مناطق ژئومورفوژنتیکی ایران تولید گردید.



نگاره ۴: پهنه‌بندی میانگین بارش سالانه ایستگاه‌های سینوپتیک کشور (دوره آماری ۱۹۷۶-۲۰۰۵)

همان طور که در نگاره (۱) دیده می‌شود بیشتر بخش‌های واقع در فلات مرکزی، شرق و جنوب کشور در منطقه خشک قرار گرفته که مهمترین ویژگی‌های ژئومورفودینامیکی این مناطق، باد شدید، فعالیت آب جاری و حرکات توده‌ای ضعیف می‌باشد. همچنین مناطق کوهستانی کشور، ارتفاعات زاگرس و البرز دارای رژیم نیمه خشک می‌باشند که عمدۀ ویژگی‌های این مناطق تأثیر باد، فعالیت آب جاری متوسط تا شدید می‌باشد. ایستگاه‌های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر و دامنه‌های غربی زاگرس دارای رژیم معتمد می‌باشند که عمدۀ ویژگی‌های این مناطق فعالیت آب جاری حداکثر، تأثیر یخبدان و باد در حد کم تا متوسط می‌باشد. تنها ایستگاهی که در این طبقه‌بندی در منطقه اقیانوسی قرار گرفت ایستگاه بندر انزلی بود که از ویژگی‌های آن می‌توان به حرکات توده‌ای شدید اشاره کرد. در نهایت کشور ایران از لحاظ وضعیت رژیم‌های هوازدگی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از تعیین محل هر یک از ایستگاه‌ها در مدل پلتیر وضعیت مربوط به هر ایستگاه در پایگاه داده وارد گردیده و مشخص شد که از هفت رژیم هوازدگی موجود در مدل پلتیر، پنج وضعیت در شرایط اقلیمی ایران اتفاق می‌افتد. در ادامه برای پهنه‌بندی این مناطق در محیط GIS به هر وضعیت یک ضریب از ۱ تا ۵ داده شد، به طوری که کمترین ضریب به هوازدگی خیلی کم و بیشترین آن به هوازدگی شیمیایی خیلی شدید تعلق گرفت (جدول ۲) و در نهایت نقشه رژیم‌های هوازدگی ایران ایجاد گردید. با توجه به دامنه‌ای بالا و بارش کم در فلات مرکزی و جنوب کشور، در این مناطق کوهستانی کشور مثل ارتفاعات زاگرس، خیلی کم اتفاق می‌افتد، اما در دامنه‌های پایین و یخبدان امکان وقوع البرز و شمال غرب به علت دارا بودن دامنه‌ای پایین و یخبدان امکان وقوع هوازدگی مکانیکی در سطح ضعیف وجود دارد. در دامنه‌های شمالی البرز و دامنه‌های غربی زاگرس در برخی از ایستگاه‌ها به علت بارش فراوان و دامنه‌ای پایین هوازدگی شیمیایی همراه با عمل یخبدان رخ می‌دهد و در برخی دیگر از این ایستگاه‌ها به علت بارش فراوان و دامنه‌ای متعادل هوازدگی شیمیایی به صورت متوسط اتفاق می‌افتد. در چند ایستگاه واقع در سواحل جنوبی دریای خزر به علت بارش خیلی زیاد و دامنه‌ای نسبتاً زیاد هوازدگی شیمیایی در سطح شدید رخ می‌دهد (نگاره ۷).



## نتیجه گیری

یکی از مهمترین منابع در مورد ژئومورفولوژی اقلیمی یافته‌ها و مدل‌های مربوط به لویس پلتیر می‌باشد که زمین‌شناسان و ژئومورفولوژیست‌ها و دیگر علوم مربوطه از آن برای شناسایی و تفسیر اشکال سطح زمین استفاده می‌کنند. از مهمترین این مدل‌ها که اطلاعات زیادی را در مورد ژئومورفولوژی اقلیمی به دست می‌دهند، مدل مربوط به طبقه‌بندی مورفوژنتیکی و رژیم‌های هوازدگی می‌باشند که در این تحقیق استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش تا حدود زیادی رضایت‌بخش بوده و نقشه‌های ایجاد شده می‌توانند نشانگر وضعیت کشور از لحاظ هوازدگی و اشکال مربوط به آن باشد. پارامترهای مختلفی می‌توانند در فرایند هوازدگی نقش داشته باشند که مهمترین آنها متوسط دما و بارش سالانه می‌باشد که مدل‌های پلتیر نیز برایه این دو پارامتر ایجاد گردیده‌اند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که رژیم دما و بارش در کشور عمده‌ای وابسته به عرض جغرافیایی و جهت و کشیدگی ارتفاعات می‌باشد که باعث تنوع در بخش‌های مختلف کشور شده و در حالت کلی ارتفاعات و جهت آنها نقش مهمی در ایجاد رژیم‌های هوازدگی و اشکال مربوطه دارند که با مقایسه نتایج بدست آمده با نقشه توپوگرافی کشور این موضوع تأیید می‌شود. همچنین مشخص گردید که از نه وضعیت مورفوژنتیکی موجود در مدل پلتیر، پنج وضعیت در شرایط اقلیمی ایران اتفاق می‌افتد و به علت قرار داشتن ایران در عرض‌های پایین، شرایط یخچالی و مجاور یخچالی در کشور به ندرت رخ می‌دهد. بیشتر بخش‌های واقع در فلات مرکزی، شرق و جنوب کشور در منطقه خشک قرار گرفته که مهمترین ویژگی‌های مورفوژنتیکی این مناطق تأثیر باد شدید، فعالیت آب جاری و حرکات توهدای ضعیف می‌باشد. همچنین مناطق کوهستانی کشور، ارتفاعات زاگرس و البرز دارای رژیم نیمه خشک می‌باشند که عمده ویژگی‌های این مناطق تأثیر باد، فعالیت آب جاری متوسط تا شدید می‌باشد. ایستگاه‌های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر و دامنه‌های غربی زاگرس دارای رژیم معتدل و ساوان می‌باشند که عمده ویژگی‌های این مناطق فعالیت آب جاری حداکثر، تأثیر یخبدان و باد در حد کم تا متوسط می‌باشد. از لحاظ وضعیت رژیم‌های هوازدگی در کشور نیز با توجه به دمای بالا و بارش کم در فلات مرکزی و جنوب کشور، در این مناطق هوازدگی خیلی کم اتفاق می‌افتد اما در مناطق کوهستانی کشور مثل ارتفاعات زاگرس، البرز و شمال غرب به علت دارا بودن دمای پایین و یخبدان امکان وقوع هوازدگی مکانیکی در سطح ضعیف وجود دارد. در دامنه‌های شمالی البرز و دامنه‌های غربی زاگرس در برخی از ایستگاه‌ها به علت بارش فراوان و دمای پایین هوازدگی شیمیایی همراه با عمل یخبدان رخ می‌دهد و در برخی دیگر از این ایستگاه‌ها به علت بارش فراوان و دمای متعادل هوازدگی شیمیایی به صورت متوسط اتفاق می‌افتد. در چند ایستگاه واقع در سواحل جنوبی دریای خزر به علت بارش خیلی زیاد و دمای نسبتاً زیاد هوازدگی شیمیایی در سطح شدید رخ می‌دهد.

## منابع و مأخذ

- ۱- Rich
  - ۲- Peltier
  - ۳- Fowler and Petersen
  - ۴- Selby
  - ۵- Robinson
  - ۶- Murton
  - ۷- Bouchard and olicoour
  - ۸- Gregory
  - ۹-Urdea and Sarbovan
- پی‌نوشت
- 11-Gregory.A.Pop, Ronald I. Dorn and John C. Dixon. " A New Conceptual Model For Understanding Geographical Variations in Weathering". Annals of Association of American Geographer, 1995, pp. 38- 64.
  - 12- Mireille Bouchard and Serge Jolicoeur, "Chemical weathering studies in relation to geomorphological research in southeastern Canada", Geomorphology 32 \_2000. 213–238.
  - 13- Peltier, Louis C. "The Geographic Cycle in Periglacial Regions as it is Related to Climatic Geomorphology". Annals of the Association of American Geographers 40 (1950): 214-236.
  - 14- Robinson,D.A. Weathering processes, products and environments. Earth Sur. Pro. and land forms. Vol.25. 2000.
  - 15- Reiche, I. "A Survey of Weathering Processes and Products". Revised Edition University of New Mexico Publishers. Geol., no. 3. 95 p. 1950.
  - 16- Selby, M.J. Hillslope material and processes.Oxford. 1993.
  - 17- Rell Fowler and James Petersen "A Spatial Representation of Louis Peltier's Weathering, Erosion and Climatic Graphs Using Geographic Information Systems (GIS)" GEO 5419, Advanced GIS II. Spring 2003.
  - 18- Urdea. P and Sarbovan. C," Some Considerations Concerning Morphoclimatic Conditions Of The Romanian Carpathians", Acta Climatologica, Universitatis Szegediensis, Tom. 28- 29, 1995.
- ۱- آمار و اطلاعات برگرفته از سایت سازمان هواشناسی کشور.
- ۲- افراخته، حسن (۱۳۷۶)، الزامات اقتصادی و اجتماعی در بازسازی