

بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی استان قم

مطالعه موردی (حوضه راهجرد)

نویسنده: محمد عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد، ژئومرفولوژی دانشگاه تهران

Email: abbas_i_1353@yahoo.com

۱۹۹۸ و ۱۹۸۸ استفاده نموده‌اند، این محققین توسعه و رشد خندقها را در طی ده ساله مورد بررسی قرار داده، و نیز حساسیت سازنده‌های مختلف و کاربری‌های متفاوت را مقایسه، و واحدهای طبقات حساس را شناسایی کردند. طباطبائی، سید محمود رضا (۱۳۷۹) عوامل طبیعی تأثیرگذار در بروز پدیده فرسایش خندقی را در اراضی جنوب شرقی شهرستان شوشتر، وجود لایه‌های مارنی و گچی در سازنده‌های میشان و آغازاری، رسوبهای ریزدانه کواترنر متصل از ذرات ریز دانه ماسه و سیلت و رس، پایداری کم خاک، ساختمان ضعیف خاکدانه‌ها، کمبود مواد آلی، وجود املاح گچ و آهک، بارندگی و تبخیر زیاد و دخالت‌های انسانی تأثیرگذار در بروز پدیده فرسایش خندقی راچرای مفرط دامها، شخم اراضی در جهت شب و آبیاری غیر اصولی در اراضی کشت آبی عنوان کرده است. طالب پور (۱۳۸۶)، به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی با استفاده از GIS-&RS (مطالعه موردی در آبخیزهای اطراف سد سفید رود) پرداخته و بدین نتیجه رسید که در مناطق تپه ماهوری یا واحد اراضی ۲.۴ با سنگ بستر نهشته‌های آبرفتی دارای شب کمتر از ۱۴ درصد، ضرورت دارد به دلیل پر هزینه بودن اصلاح خصوصیات قابل اصلاح خاک از یکسو اقدام به ممانعت از تمرکز رواناب‌های سطحی در چنین مناطقی نموده و از سوی دیگر اقدام به اصلاح و بهبود وضعیت مراتع و جلوگیری از تخریب آنها شود.

کرک بای و بول (۲۰۰۰)^(۱) بر اساس مطالعات انجام شده بر این نکته تأکید نموده‌اند که شناخت عوامل مؤثر در شکل‌گیری و رشد و گسترش فرسایش خندقی به عنوان روشی کارآمد برای دستیابی به راهکارهای پیشگیری و مهار آن افزون بر ابداع مدل پیش بینی به حساب می‌آید. شاهینی (۱۳۸۴)، نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خندقی را مورد بررسی قرار داده به این نتیجه رسیده که قرق اراضی، منجر به استقرار گونه‌های بسیاری در منطقه می‌شود به طوریکه اثری از آنها در منطقه خارج قرق مشاهده نمی‌شود. همین طور گسترش رأس خندقها مقاومت و درصد رطوبت حجمی خاک سطحی و نوع گونه‌ای با احیای پوشش گیاهی حوضه آنها به طور معنی داری نسبت به خندقها گروه شاهد بعد از گذشت ۳ سال اختلاف داشته است.

(ارناسر مالیک، ۲۰۰۷، ۴۱)^(۲) طی بررسی‌های صورت گرفته بر روی خندق‌های کوچک در فلات جنوبی لهستان، مشخص گردید که خندق‌های کوچک به روش‌های مختلف در کف دره‌ها و یادربیش آنها تشکیل می‌شوند، در ته دره‌ها اشکال فرسایشی اغلب در فاصله‌های اندکی از یکدیگر تشکیل شده‌اند، و در این زمان خندق‌های کوچک به شکل مفرد یا طولی ترکیب می‌شوند. بر حسب شرایط محلی، مانند نیم‌رخ شب، شب‌ها ممکن است

چکیده

فرسایش خندقی از جمله انواع فرسایش آبی و تشدید شونده است که رخداد و گسترش آن موجب تغییرات بارز در منظر سرفت اراضی و تخریب محیط‌زیست می‌شود. با توجه به تنوع و میزان تأثیر عوامل مختلف در شکل‌گیری و گسترش فرسایش خندقی که از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر نوع و میزان تأثیر آن تغییر می‌کند و به منظور شناسایی مهم ترین عوامل مشارکت‌کننده در خندقی شدن اراضی جهت معرفی راههای پیشگیری و مهار این نوع فرسایش در حوضه راهجرد که از حوضه‌های آبخیز واقع در استان قم می‌باشد، در این تحقیق برای شناسایی مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی از عکس‌های هوایی به مقیاس ۱/۲۰۰۰۰، تصاویر ماهواره‌ای IRS هند، بازدید صحرایی و عملیات گستردۀ میدانی از طریق GPS، استفاده و نقشه پراکنش فرسایش خندقی تهیه گردید. بررسی هاشان داده‌های خصوصیات سنگ‌شناسی، شب، منابع و قابلیت اراضی، جهت شب و کاربری اراضی عوامل اصلی مؤثر در وقوع فرسایش خندقی هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده‌ای واحدهای سنگ‌شناسی ۲۵/۸۸ Mpa.bvt درصد و ۷۴/۱۲ QFt۲ درصد و تیپ اراضی واریزه‌های بادبزنی شکل سنگریزه‌دار (مخروط افکنه‌ها) ۱۰۰ درصد از مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی را به خود اختصاص داده‌اند، ضمناً طبقه شب ۰-۱ درصد (درصد ۹۳/۶)، جهت شب شرقی (۰۹/۶۳ درصد) و کاربری مراعع متوسط (۰۰/۱ درصد) دارای بیشترین گسترش مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی در حوضه آبخیز مورد مطالعه می‌باشند.

واژه‌های کلیدی

فرسایش خندقی، ژئومرفولوژی، حساسیت اراضی و حوضه راهجرد

مقدمه

فرسایش خاک به وسیله آب و پیامدهای ناشی از آن از دیر باز مورد توجه پژوهشگران حفاظت خاک بوده است. از میان انواع مختلف اشکال فرسایش آبی، فرسایش خندقی یکی از عوامل مهم و تهدید کننده تعادل منابع زیست محیطی و پایداری آن محسوب می‌شود. به طوری که این تهدید تنها محدود به ایجاد تغییرات نا به هنگار در منظر زمین، تخریب اراضی و از بین رفتن خاک و عدم امکان فعالیتهای کشاورزی و بهره‌برداری اقتصادی از عرصه‌های منابع طبیعی نمی‌شود، بلکه با رخداد و گسترش این نوع فرسایش، جاری شدن تندابها و سیل، جابجایی حجم قابل توجهی از رسوبات و پیامدهای ناشی از آن و بالاخره غیر قابل استفاده شدن اراضی تشدید می‌شوند (قدوسی و همکار ۱۳۸۴).

لاجوردی و همکاران (۱۳۸۰) تأثیرات تغییرات کاربری اراضی را بر فرسایش خندقی مورد بررسی قرار داده و از داده‌های ماهواره‌ای سالهای

مورفوژیکی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی ارتباط بین شیب و مناطقی که تحت تأثیر فرسایش خندقی قرار گرفته، بیانگر این بوده که حدود ۹۳/۶ درصد از خندقهای راهجرد شیب ۰ تا ۱۰ درصد رخ داده‌اند. جدول (۱) توزیع طبقات شیب و میزان مساحت خندقی شده را در حوضه راهجرد نشان می‌دهد.

جدول (۱) توزیع طبقات شیب و میزان مساحت خندقی شده در حوضه راهجرد

خندق (درصد)	مساحت خندق (هکتار)	درصد طبقات	مساحت طبقه (هکتار)	طبقات شیب
۴۸/۹۴	۲۸۹/۲۸	۴۶/۶۷	۱۳۱۸۹۵/۹۳	۰-۵
۴۴/۶۶	۲۶۴	۲۶/۰۵	۷۳۶۲۹/۶۴	۵-۱۰
۶/۲۵	۳۶/۹۲	۱۴/۱۲	۳۹۹۰۷/۳۴	۱۰-۲۰
۰/۱۶	۰/۹۲	۱۳/۱۶	۳۷۱۹۰/۹۳	>۲۰

جهت شیب


نتیجه ارتباط بین جهات شیب با خندقهای بیانگر این می‌باشد که بیشترین درصد خندقهای در این حوضه با ۶۲/۰۹ درصد در جهت شرق صورت گرفته است. جدول (۲) توزیع طبقات جهت شیب و میزان مساحت خندقی شده را در حوضه راهجرد نشان می‌دهد.

جدول (۲) توزیع طبقات جهت شیب و میزان مساحت خندقی شده در حوضه راهجرد

خندق (درصد)	مساحت خندق (هکتار)	درصد طبقات	مساحت طبقه (هکتار)	طبقات جهت شیب
۲/۷۱	۱۵/۹۹	۴/۰۶	۱۱۴۷۵/۸۸	FLAT
۶/۳۸	۳۷/۷۴	۱۷/۴۴	۴۹۲۷۶/۸۳	N
۶۲/۰۹	۳۶۷/۰۴	۳۱/۵۱	۸۹۰۵۱/۰۰	E
۲۰/۱۰	۱۱۸/۸۴	۲۷/۵۴	۷۷۸۲۶/۷۳	S
۸/۷۱	۵۱/۵۱	۱۹/۴۶	۵۴۹۹۴/۶۵	W

لیتوژئی

نتیجه بررسی ارتباط بین متغیر لیتوژئی با خندقهای حاکم از این بود که کلیه مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی در قسمتهایی از حوضه که دارای واحدهای لیتوژئی QFt2, MPa.bvt می‌باشد، قرار گرفته‌اند. نگاره (۱) نقشه لیتوژئی حوضه راهجرد را نشان می‌دهد.



نگاره ۱: نقشه لیتوژئی
حوضه راهجرد

منابع و قابلیت اراضی

نتیجه بررسی ارتباط منابع و قابلیت اراضی با مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد تمام خندقهای در واحد اراضی واریزه‌های بادبزنی شکل سنگریزه دار (مخروط افکنه‌ها)، (۸/۱) رخ داده‌اند. نگاره (۲) نقشه منابع و قابلیت اراضی حوضه راهجرد را نشان می‌دهد.

فرساش فوکانی یا تحتانی را نشان دهنده. شیب خندقهای ممکن است به سمت دره‌ها که نتیجه پهنا و عمق تدریجی یا کم آنها است، تغییر شکل داده باشد. نرخ متوسط فرسایش خندق کوچک در سیستم قدیمی خندق ۰/۶۳m/year و در کف مطالعه شده بود. در شیب‌ها نرخ متوسط خندق ۰/۵۲m/year و در کف دره‌ها ۰/۱۸-۰/۹۸m/year است. چنگ و همکاران (۲۰۰۵)، در مطالعه خندقهای موقعی دریک حوزه آبخیز کوچک مرتفع در فلات مغولستان در شمال چین، با تعیین مورفوژئی این گالیها، با استفاده از GPS اثرات فرسایش خاک بر میزان محصول در اراضی زراعی و ترکیبات گیاهی در زمینهای تحت آیش را بررسی نموده و سپس به بررسی گودالهای موقعی گالی که در میان شبکه گالیهای موقع واقع شده‌اند و عرض و عمق آنها، بیش از ۰/۵ متر است پرداخته و در نهایت به یک نشانگر کلیدی برای تخمین موقعیت رأس گالیهای گودالی موقعی در آن وجود دارد پرداختند.

اسمیت (۴) و همکاران (۲۰۰۶)، طی بررسی‌هایی که بر روی زمان و عوامل ایجاد فرسایش خندقی در سیستم خندقی Lisi jedliczny Dol جنوب شرقی لهستان به عمل آورده با این فرضیه که با دانستن علت و زمان آغاز روند فرسایش خاک منطقه در گذشته، می‌توان به تأثیرات کاربری اراضی در تغییرات زمین منظر پی برد، نهایتاً به این نتیجه رسیدند که در مناطق شنی، فرسایش خاک براثر کاربری بی رویه زمین و فروپاشی آن بواسطه بارش شدید می‌تواند به طور چمشگیری زمین منظر را تغییر دهد.

مواد و روشها

حوضه راهجرد با مساحت حدود ۲۸۲۶۲۳/۸۴ هکتار در استان قم قرار دارد. اطلاعات مورد استفاده بر اساس مطالعات و بررسیهای کتابخانه‌ای، عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های توپوگرافی، نقشه‌های زمین‌شناسی و عملیات صحراخی بوده است. از نظر لیتوژئی بیشتر مساحت حوضه از واحدهای Mur, QFt2 و از لحاظ ژئومرفولوژیکی از واحد فلاتها و تراسهای فوقانی تشکیل شده است. کاربری حوضه مورد مطالعه مشکل از مراعع متوسط و ضعیف می‌باشد. برای تهیه نقشه مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی از عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و سیستم موقعیت یاب جهانی (۵) استفاده گردید. برای انجام پژوهش حاضر، پس از رقومی نمودن لایه‌های زمین‌شناسی، اجزای اراضی، شیب، کاربری اراضی و جهت شیب در محیط GIS و با استفاده از نرم‌افزار ILWIS، اقدام به طبقه‌بندی متغیرها گردید. سپس به بررسی ارتباط پارامترهای مزبور با خندقهای حوضه پرداخته شود.


یافته‌های تحقیق

بعضی از مهمترین پارامترهایی که در ایجاد فرسایش خندقی و ارتباط آنها با خندقهای تأثیرگذار بوده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از:

شیب

شیب، سرعت فرسایش و شکل زمین را از طریق خصوصیات


- ۲- زارع مهرجردی، محمد، مجید صوفی و سعید چوپانی، ۱۳۸۴، بررسی ویژگی‌های آبکندهای استان هرمزگان و علل ایجاد آنها، نشریه علمی ترویجی حفاظت آب و خاک، صفحه ۴۱، ۳۵-۴۲، ص ۴۱.
- ۳- زیری، محمود دالکی، احمد، ۱۳۶۸، اصول تفسیر عکس‌های هوایی و کاربرد آن در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۵۱ صفحه.
- ۴- طباطبائی، سید محمود رضا، ۱۳۷۹، بررسی تغییرات فرسایش خندقی در استان خوزستان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دوین همايش ملي فرسایش و رسوب، صفحه ۶۴، ۷۷-۶۳، ص ۶۴.
- ۵- طهماسبی پور، ناصر، ۱۳۷۱، ارزیابی قابلیت فرسایش خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۱۲۴ صفحه.
- ۶- عباسی، علی اکبر، ۱۳۸۱، دستورالعمل مهار فرسایش خندقی، از مجموعه دستور العمل های فائق (ترجمه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران)، ۶۰ صفحه.
- ۷- فیض‌نیا، سادات، ۱۳۷۸، سازندۀ دوره کواترنر (مبانی نظری و کاربردی آن در منابع طبیعی)، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۵۷ صفحه.
- ۸- قدوسی، جمال، ۱۳۸۲، مدل سازی مرفلوژی فرسایش خندقی و پهنه بندی خطر آن (مطالعه موردی در آبخیز زنجان رود) رساله دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ۳۳۶ صفحه.



نگاره (۲) نقشه منابع و قابلیت اراضی
حوضه راهجرد

کاربری اراضی

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده درباره عوامل مؤثر در رخداد فرسایش و رسوب نشانگر این است که در اکثر حوزه‌های آبخیز نوع استفاده از اراضی نقش مهمی در رخداد و تشید فرسایش و تولید رسوب دارد (قدوسی و همکاران، ۱۳۸۵) نتایج حاصل از تلفیق نقشه کاربری اراضی حوضه راهجرد با نقشه مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی نشان داد که تمام خندقها در کاربری مراعع متوسط رخ داده‌اند. نگاره (۳) نقشه کاربری اراضی حوضه راهجرد را نشان می‌دهد.



نگاره (۳) نقشه کاربری اراضی در حوضه راهجرد

مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی

نقشه مناطقی که تحت تأثیر فرسایش خندقی قرار گرفته، با استفاده از تفسیر عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و عملیات صحرائی با استفاده از GPS تهیه گردیده است. میزان مساحت مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی حدود ۵۹۱/۱۲ هکتار محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

یکی از مهمترین فرآیندهای تخریب زمین که به شدت بهره برداری از زمین را محدود می‌کند پدیده فرسایش خندقی می‌باشد. نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داده است که واحدهای Mpa. bvt, QFt2 دارای بیشترین رخداد فرسایش بوده (۱۰۰ درصد) و تیپ اراضی واریزه‌های بادبزنی شکل سنگریزه دار (مخروط افکنه) ۱۰۰ درصد از مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی را به خود اختصاص داده‌اند. ضمناً طبقه شیب ۵-۱۰ درصد (۹۳/۶ درصد)، جهت شیب شرقی (۶۲/۰۹ درصد) و کاربری مراعع متوسط (۱۰۰ درصد)، دارای بیشترین گسترش مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی در حوضه راهجرد می‌باشند. جلوگیری از تخریب بیشتر پوشش گیاهی و تقویت آن جهت مقابله با این نوع فرسایش در حوضه پیشنهاد می‌شود.

منابع و مأخذ

- ۱- رفاهی، حسینقلی، ۱۳۷۵، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۵۱ صفحه.