

# بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد

کمال امیدوار<sup>۱</sup>

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۰۹/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۰۷/۳۱

## چکیده

در بیشتر مناطق کشور به ویژه در ارتفاعات بلند، نوع غالب بارش به صورت برف است که می‌تواند منبع اصلی تأمین کننده آب رودها، چشمه‌ها، سفره‌های آبی زیر زمینی و قنات‌ها محسوب شود. به سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی، ارتفاعات بلند استان یزد نیز یکی از مناطق برف‌خیز کشور است. هدف این تحقیق شناخت، بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد است. بدین منظور پس از شناسایی موقعیت جغرافیایی منطقه و با توجه داده‌های مورد نیاز، ۱۲ دوره بارشی برف در طول دوره آماری ۱۹۹۹-۲۰۱۱ شناسایی شدند. برای شناسایی حرکت توده هوا و بررسی سامانه‌های همدید به استان، از داده‌های برف و بارش روزانه و نقشه‌های همدید سطح زمین و ترازهای فوکانی جو، روبداد، امگا، چرخندگی و وزش رطوبتی، از پایگاه NCEP/NCAR استخراج و نقشه‌های مربوطه در محیط GrADS ترسیم شده است: پس از بررسی‌های ترمودینامیکی هوایی که استان یزد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و مطالعه ویژگی‌های دینامیکی از نظر تقویت و تضعیف سامانه‌های فشاری و تحلیل همدید آن‌ها، سه الگوی همدیدی و فشاری استخراج شده است. در الگوی اول سامانه‌های ترکیبی شرق مدیترانه و سودانی به همراه عمیق‌تر شدن ناوه شرق مدیترانه و نفوذ هوای سرد از زبانه‌های پرفشار عرض‌های بالا و شمال کشور، سبب ریزش برف به ویژه در ارتفاعات استان یزد می‌شود. در الگوی دوم با ایجاد پدیده بلوکینگ سبب ماندگاری هوای سرد به مدت چند روز در استان به همراه ناوه عمیق شرق مدیترانه و دریای سرخ و فعالیت همزمان این دو توده هوای جبهه‌ای سبب ریزش برف و سرمای شدید در استان یزد می‌شود. در الگوی سوم با استقرار و نفوذ پرفشار دریای خزر و سیبری و ایجاد پدیده کم فشار بریده (سردچال) در نواحی شمالی و مرکزی ایران باعث ریزش برف در نواحی مرکزی و استان یزد می‌شود. واژه‌های کلیدی: برف، نقشه همدید، الگوی همدید، بلوکینگ، کم فشار بریده، استان یزد.

\*\*\*\*\*

## مقدمه

می‌دهد، شناسایی الگوهای همدید ریزش برف ضمن کمک به پیش‌بینی بارش برف، در بخش هیدرولوژی نیز می‌تواند مفید واقع شود (سازمان هواشناسی کشور، ۱۳۹۷: ۲۱۳-۲۱۴).

به سبب شرایط توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی، ارتفاعات بلند استان یزد از جمله ارتفاعات شیرکوه، عقدا و خرانق در استان یزد، یکی از مناطق نسبتاً برف خیز کشور است و برف‌های ثبت شده در این منطقه نیز قابل بررسی است.

هدف این تحقیق شناخت الگوهای همدید و فشاری سامانه‌هایی است که منجر به ریزش برف در ارتفاعات استان یزد شده و زمینه لازم برای شناخت بیشتر و پیش‌بینی رخداد چنین برف‌هایی در این منطقه را ایجاد نموده و می‌تواند ذخیره بسیار مناسبی جهت تغذیه چشممه‌ها و تقویت و تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی و قنات‌ها در این منطقه از کشور باشد.

## پیشینه تحقیق

بویدن<sup>۱</sup> (۱۹۶۴: ۳۶۵-۳۶۳) با مقایسه شش عامل پیش‌بینی کننده برای تعیین نوع بارش (برف یا باران) نتیجه گرفت که بهترین عامل ارتفاع تراز یخ‌بندان و پس از آن، ترکیبی از فشار ضخامت لایه ۸۵۰-۱۰۰۰ هکتوپاسکال است. یانکین<sup>۲</sup> (۱۹۶۱: ۱۰۳-۱۰۵) که با در نظر گرفتن آستانه بارش برف ۱۰ سانتی‌متری در مدت ۱۲ ساعت، الگوهای همدید آن را با استفاده از نقشه‌های ضخامت برای دوره زمانی ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۷ در غرب آمریکا شناسایی کرد. بیرکلند و ماک<sup>۳</sup> (۱۹۹۷: ۲۱۷-۲۱۱) ضمن توصیف الگوهای چرخشی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال برای روزهای همراه با حداقل ۳۲ سانتی‌متری بارش برف در ایالت مونتانای آمریکا، ارتباط بسیار نزدیک چنین بارش‌هایی را که منجر به وقوع بهمن می‌شوند با ارتفاع غیر متعارف تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال را اثبات نمودند.

یکی از اشکال مختلف بارش، برف است که از چگالش توده‌های هوای مرطوب در طی صعود و در شرایطی که دمای هوا کمتر از نقطه انجماد باشد صورت می‌گیرد. در این شرایط به جای قطره‌های آب، بلورهای شش وجهی برف ایجاد می‌شود که به تدریج در اثر برخورد و پیوستن به یکدیگر دانه‌های برف با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف به وجود می‌آید (غیور و همکاران، ۱۳۹۳: ۳۳-۱۵). بخش زیادی از بارش در سطح کره زمین به صورت برف ریزش می‌کند که برای مدتی کم یا زیاد در سطح زمین باقی می‌ماند و در نهایت در چرخه هیدرولوژی وارد می‌شود. در بسیاری از مناطق سطح زمین، آب حاصل از ذوب برف منبع اصلی ذخیره آب‌های سطحی و زیر زمینی و حتی عامل اصلی سیلان به شمار می‌رود. از لحاظ ریز اقلیم، پوشش برف به دلیل رسانش گرمایی ضعیف، پوشش خوبی برای زمین زیر خود در مقابل سرما به شمار می‌آید (کاوینی، ۱۳۹۷: ۱۲۱).

با وجود این که گردش عمومی هوا به لحاظ زمانی و مکانی دارای الگوهای متنوعی است ولی تغییرات شدید عوامل و عناصر جوی سبب ناهنجاری‌هایی در این الگو شده و نتیجه آن تغییر در رژیم دما، رطوبت و فشار مناطق مختلف کره زمین می‌باشد. یکی از این تغییرات مهم جوی ریزش برف است. به طور کلی ریزش برف به دمای محیط بستگی دارد. در نواحی پست واقع در عرض‌های پایین برف به ندرت ریزش می‌کند، در حالی که در عرض‌های قطبی، میانی و ارتفاعات بلند بخش زیادی از بارش سالانه به صورت برف است. در نتیجه در یک مکان معین، سهم برف نسبت به کل بارش، با کاهش دما یا افزایش ارتفاع بیشتر می‌شود (علیجانی و کاوینی، ۱۳۹۲: ۲۶۲-۲۶۱).

در برخی مناطق ایران به ویژه در ارتفاعات، نوع بارش غالب به صورت برف است که منبع مهم جریان رودخانه‌ها و چشممه‌ها نیز محسوب می‌شود (غیور و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۶). در شرایط ایران که آب ناشی از ذوب برف بخش زیادی از منابع تغذیه کننده جریان‌های سطحی و زیرزمینی را تشکیل

1- Boyden

2- Younkin

3- Birkeland &amp; Mock

## فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (۲۸)

بررسی و تحلیل همدید - دینامیک ریزش برف ... / ۲۲

۲۴ الگوهای جوی مربوط به روزهای بارش برف سنگین در منطقه شمال غرب ایران را بر اساس تحلیل مؤلفه‌های اصلی روزهایی که حداقل شدت برف ۱۵ سانتی‌متر در مدت ۲۴ ساعت بود را با استفاده از نقشه‌های ترکیبی فشار سطح دریا، تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و صخامت ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ هکتوپاسکال بررسی کردند. نتایج شش الگوی مشخص شده نشان از نفوذ رطوبت جريان جنوب غربی به دلیل فعالیت سیستم کم فشار بر عراق است که بسیاری از این گروه‌ها با جريان شرقی یا شمال شرقی سرد، مخلوط و عامل اصلی محسوب می‌شود.

در ایران مطالعات چندی در رابطه با پدیده برف از اوایل دهه ۱۳۶۰ به بعد صورت گرفته است که بیشتر در زمینه هیدرولوژی برف و کمتر درباره الگوهای همدیدی آن بوده است. پدرام (۱۳۷۵) در تحلیل همدید ریزش برف در ایران، نتایج حاصل برای یک روز برفی در ۲۳ بهمن ۱۳۷۲ در تهران را نشان داد که استقرار کم فشار مدیترانه‌ای در غرب به همراه گسترش یک جبهه سرد به سمت کشور و همراهی با مرکز کم ارتفاع در ترازهای بالایی جو، باعث ریزش برف در استان‌های غرب کشور و تهران می‌شود. غیور و همکاران (۱۳۸۳) با استفاده از داده‌های مربوط به درجه حرارت و نیز آمار میانگین بارش ماهانه و سالانه ایستگاه‌های شمال تهران به برآورد سطح پوشش و مقدار برف در ماههای مختلف سال پرداخته‌اند. نتایج محاسبات آن‌ها نشان می‌دهد که برف گیری در این حوضه از اکتبر شروع شده و در ماههای دسامبر و زانویه به حدأکثر خود می‌رسد. فرید مجتهدی و همکاران (۱۳۹۵: ۱۵۶-۱۳۳) در واکاوی همدید رخداد بارش برف سنگین فوریه سال ۲۰۰۵ گیلان به این نتیجه رسیدند که استقرار سامانه پرفشار شبه بندهای در شمال شرق دریایی خزر و حرکت غرب سوی آن به اروپای شرقی و هم‌مان با حرکت شرق سوی انتهای ناوه اسکاندیناوی-شرق مدیترانه و قرارگیری آن به صورت ناوه مورب در شمال شرق ایران باعث ریزش سنگین برف در این استان شده است. سازمان هوواشناسی کشور (۱۳۸۷) با

پل و راسل<sup>۱</sup> (۱۹۷۷: ۶۶۷-۶۶۳) در تحلیل بارش برف سنگین در مرکز و شرق آمریکا بیان می‌کند که پیش‌بینی‌های اخیر برای راهنمایی و مدیریت بارش برف سنگین تنها به یک درجه موققیت رسیده است. دانیال و جیم<sup>۲</sup> (۲۰۰۱: ۱-۹) در مطالعه‌ای به این نتیجه می‌رسند که در پاییز ۱۹۹۹ رویداد سیکلون بریده شده تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال موجب بارش برف در سطح کوه‌های شمال نیویورک و شمال ورمونت می‌شود. کونراد و کنت<sup>۳</sup> (۱۲۵-۲۰۰۴: ۱۱۶) پس از مطالعه بارش برف سنگین ۱۸ و ۱۹ مارس ۱۹۵۶ در شمال شرقی ساحل اطلس ایالات متحده به این نتیجه می‌رسند که ماه مارس ۱۹۵۶ در این منطقه با فصل تأخیر توفان‌های برفی مشخص می‌شود و این توفان به طور نامتعارفی به وجود می‌آید و پیش‌بینی را دچار مشکل می‌کند. برین<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۰۴: ۱-۵) در مطالعه موردی توفان بسیار کمیاب تندri همراه با بارش برف بیان می‌کنند در بعد از ظهر ۱۱ فوریه ۲۰۰۳، توفان تندri با عبور از مرکز و شمال غرب لینوس با بادهای بیشتر از ۵۰ نات با ریزش برف سنگین همراه بود. بیکر<sup>۵</sup> و همکاران (۱۱۹-۲۰۰۴: ۱۱۹) در بررسی جريان شمال غربی بارش برف جنوب ارتفاعات آپالاش با استفاده از نقشه‌های هوای روزانه نوا، الگوهای همدید و فضایی بارش برف را برای دوره اکتبر ۱۹۸۰ تا می ۱۹۹۰ این منطقه مشخص کردند. استبان<sup>۶</sup> و همکاران (۳۲۹-۳۱۹: ۲۰۰۵) در تحقیقی با استفاده از نقشه‌های ترکیبی فشار سطح دریا، تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و نقشه صخامت الگوهای گردش جوی مربوط به روزهای بارش برف سنگین در ناحیه آندورا از کوه‌های پیرنه را بررسی کردند. نتایج تحقیق هفت الگوی گردشی را نشان داد که بیشتر آنها جزء جريان‌های اطلس و بقیه با فرارفت مدیترانه که می‌تواند با هوای سرد قاره‌ای ترکیب شود را نشان می‌دهد. امینی نیا و همکاران (۱۷-۲۰۱۰: ۲۰۰۵) در

1- Paul & Russel

2- Denial & Team

3- Conrad& Kenneth

4- Brain

5- Baker

6- Eesteban

بارشی شده و فراهم بودن سایر شرایط همدید لازم، مانند وجود پرفشار قوی در سطح زمین، منجر به ریزش برف مداوم و سنگین می‌شود. شکیبا (۱۳۹۲) با تحلیل همدید برف سنگین در شمال غرب ایران به نتیجه رسید که در تمام الگوهای جوی در تراز میانی ناوهای در شرق دریای مدیترانه و در غرب منطقه مورد مطالعه عمیق شده که در تراز زیرین سبب ایجاد همگرایی و مقادیر منفی امگا و در نتیجه جریان‌های صعودی به ویژه در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال موجب بارش برف سنگین در این منطقه از کشور می‌شود. ریزش برف در استان یزد نسبتاً کم اتفاق می‌افتد، با این حال تحقیقی در زمینه شناسایی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در این استان انجام نشده است که هدف این پژوهش می‌باشد.

### داده‌ها و روش‌ها


جهت شناسایی و تحلیل همدید- دینامیک غالب ریزش برف در استان یزد، پس از بررسی موقعیت جغرافیایی منطقه (نگاره ۱)، دوره‌های ریزش برف شناسایی شدند. بدین منظور، با توجه به آمار و اطلاعات بارش روزانه برف، ۱۲ دوره برف ریزش کرده در استان یزد در طول دوره آماری ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ شناسایی گردیدند (جدول ۱). برای شناسایی حرکت توده هوا، ناپایداری‌ها و بررسی همه سامانه‌های همدید در طول دوره آماری مورد نظر به سمت استان و تهیه و تحلیل نقشه‌های همدید سطح زمین، ترازهای فوقانی جو (ترازهای ۸۵۰، ۵۰۰ و ۳۰۰ هکتوپاسکال)، روبداد، امگا، چرخندگی، و وزش رطوبتی در ساعت‌های صفر و ۱۲ گرینویچ از دو روز قبل از ریزش برف تا پایان آن از پایگاه داده‌های مرکز ملی پیش‌بینی محیطی NCFP/NCAR استخراج و با استفاده از نرم افزار GrADS نقشه‌های مربوط به این دوره‌های برفی ترسیم گردیدند. داده‌های روزانه برف و بارش و دمای حداقل نیز از سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان یزد تهیه شده است. برای بررسی ویژگی‌های ترمودینامیک هوایی که استان را

استفاده از داده‌های روزانه مربوط به تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال و تراز دریا چهار الگوی همدید بارش‌های برف سنگین را برای غرب و جنوب غرب ایران استخراج کردند. صفری و صلاحی (۱۳۹۱: ۱-۱۵) با استفاده از نقشه‌های همدید به صورت روزانه تراز سطح دریا و تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال الگوی دینامیکی جو در دوره ریزش برف در کرمانشاه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که بسیاری از ریزش‌های برف سنگین در این شهر، با زبانه‌های پرفشاری و قرار گیری این شهرستان در زیر جلو فراز موج بادهای غربی در ارتباط است. شکل گیری پرفشار در شمال دریای خزر و گسترش ناوه ای از اسکاندیناوی تا شرق مدیترانه و به صورت مورب و شرق سو تا غرب و شمال غربی ایران، سبب ریزش برف در منطقه مورد مطالعه شده است. پروانه و همکاران (۱۳۹۱: ۱-۴۰) در شناسایی علل همدید روزانه بارش برف سنگین در غرب ایران نتیجه گرفتند که در روزهای همراه با بارش برف سنگین در منطقه در بیشتر موارد پرفشار سیری گسترش وسیعی داشته است و زبانه‌ای از آن به شرق ارال و زبانه دیگری به سمت جنوب تا تبت گسترش و در مواردی نیز زبانه آن از طریق دریای خزر و نیمه شمالی ایران به سمت اروپا امتداد یافته است.

فهیمی نژاد و همکاران (۱۳۹۱: ۳۰۲-۲۱۱) توفان برف ۲۰۰۵ استان گیلان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سه الگوی پرفشار ترکیبی زبانه پرفشار بالکان و سیری در دریای خزر، الگوی پرفشار بالکان و پرفشار سیری باعث ریزش برف سنگین در این استان شده است. درگاهیان و علیجانی (۱۳۹۲: ۱-۱۶) به منظور شناخت و بررسی الگوهای بلوکینگ مؤثر بر بارش برف سنگین و مداوم ایران از داده‌های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال در فصل سرد در یک دوره ۶۰ ساله، چهار الگوی غالب بلوکینگ بر بارش را استخراج کردند که از این چهار الگو تنها یک الگو بر بارش برف مداوم و شدید مؤثر بود. الگوی بلوکینگ امگا منجر به بارش برف مداوم و سنگین می‌شود و ریزش هوای سرد از عرض‌های بالا سبب تقویت سامانه

نگاره ۱- موقعیت جغرافیایی و ایستگاه‌های

منطقه مورد مطالعه



که بیشترین تأثیر را بر بارش‌های برف در استان داشتند استخراج گردید:

### الگوی اول

در این الگو ضمن نفوذ هوای سرد از عرض‌های بالا، کم فشارهای واقع در شرق مدیترانه و عربستان با هم ترکیب شده و ضمن عمیق تر شدن ناوه شرق مدیترانه و حرکت شرق سوی آن، ایران و استان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در روزهای بعد نیز نفوذ هوای سرد به همراه زبانه‌های پرفشار در نیمه شمالی ایران و تشکیل مراکز کم فشار مناسب شرق مدیترانه و سودانی و ترکیب آن‌ها سبب استقرار چند روزه این سامانه‌ها بر روی ایران و استان یزد و ریزش برف به ویژه در ارتفاعات استان یزد شده است. نمونه این الگو در دوره برفی روزهای ۷ تا ۱۵ زانویه ۲۰۰۴ تحلیل می‌شود.

بررسی پارامترهای ترمودینامیک جو بالای منطقه نشان می‌دهد که با توجه به شاخص‌های ناپایداری Si و Ki در روز ۷ زانویه که به ترتیب ۳ و ۲۶ بوده، شرایط و وضعیت

تحت تأثیر خود قرار می‌دهد (از نظر پایداری و ناپایداری) و مطالعه خصوصیات دینامیکی از نظر امکان تقویت و تضعیف سامانه‌های فشاری، از داده‌های ایستگاه جو بالای منطقه نیزاستفاده شده است. پس از بررسی ریزش برف ایستگاه‌ها، ناپایداری‌های جوی در منطقه به کمک مهمنترین شاخص‌های ناپایداری Si و Ki محاسبه شده است.

سپس با مطالعه و تحلیل همدیدی-دینامیکی تمام ۱۲ دوره ریزش برف، سه الگوی همدید و فشاری که باعث ریزش برف با شرایط مختلف در استان یزد شده‌اند و در برگیرنده تمام این دوره‌های برفی است، شناسایی شده و سپس این سامانه‌ها تحلیل گردیدند. جهت کم شدن حجم مقاله از هر الگو یک دوره بارش برف تحلیل و از برخی نقشه‌های مربوطه در ساعت صفر گرینویچ استفاده شده است.

### نتایج و بحث

با مطالعه و تحلیل همدید- دینامیک ۱۲ دوره بارش برف در طول دوره آماری مورد نظر در استان یزد، سه الگو

جدول ۱ - تاریخ دوره‌های برفی در استان یزد


ماه و روز	سال	ماه و روز	سال	ماه و روز	سال
ژانویه ۷-۱۵	۲۰۰۴	مارس ۲۳-۲۹	۲۰۰۳	آوریل ۲-۸	۱۹۹۹
دسامبر ۱۸-۲۲	۲۰۰۷	آوریل ۱-۳	۲۰۰۷	دسامبر ۱-۳	۲۰۰۶
دسامبر ۱-۳	۲۰۰۹	فوریه ۱۹-۲۳	۲۰۰۹	ژانویه ۶-۱۱	۲۰۰۸
فوریه ۱-۳	۲۰۱۱	ژانویه ۱۰-۱۶	۲۰۱۱	ژانویه ۵-۱۳	۲۰۰۲

با توجه به این که نسبت آمیزه در سطح زمین و تراز ۷۰۰ هکتوپاسکال به ترتیب ۷ و ۵ گرم بر کیلوگرم است و در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال آن هم در دمای ۱۴-۱۵ درجه سلسیوس حدود ۲ گرم بر کیلوگرم می‌باشد، بنابراین نشان از وجود آب و رطوبت نسبتاً کافی و ناپایداری در جو این منطقه است و تغذیه مناسب رطوبت و گرما از آب‌های جنوب کشور توسط سامانه‌های باران زا در این دوره بارشی انتخابی را به اثبات می‌رساند.

جریان‌های جوی حاکم بر منطقه در روز ۷ ژانویه بررسی نقشه‌های هواشناسی سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ حاکی از استقرار مرکز کم فشار ۱۰۰۵ هکتوپاسکال بر روی شرق مدیترانه، شرق عربستان و نواحی مرکزی و جنوبی ایران بوده که زبانه هم فشار ۱۰۱۵ هکتوپاسکال آن سواحل دریای خزر تا نواحی مرکزی کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. بر روی غرب دریای سرخ و مرکز عربستان سلول بسته کم فشار ۱۰۱۰ هکتوپاسکال مشاهده می‌شود (نگاره ۲) که در اواخر این روز این مرکز کم فشار مستقر بر روی عربستان و نواحی جنوبی ایران با کم فشار مستقر در شرق مدیترانه با هم ترکیب شده و سبب بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در برخی ایستگاه‌های منطقه شده است. در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال کم ارتفاع بسته ۱۳۶ ژئوپتانسیل دکامتر با محور تقریباً قائم در شرق مدیترانه، غرب و شمال غرب ایران قرار داشته که زبانه‌های ۱۴۴ و ۱۴۸ ژئوپتانسیل دکامتر آن بیشتر نواحی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است و پشتۀ ضعیفی در نواحی غرب ایران قرار دارد (نگاره ۳).

ناپایداری در لایه‌های میانی جو استان در روز ۷ ژانویه حاکم است. به طور کلی در تمام روزهای بارشی انتخابی این دوره، جو نسبتاً ناپایداری را در لایه‌های میانی و زیرین جو داشته که بیشتری ناپایداری آن در روز ۱۲ ژانویه رخداده است زیرا شاخص‌های ناپایداری Si و Ki به ترتیب در این روز ۱ و ۳۰ را نشان می‌دهد.

با مشاهده دمای پتانسیل تر در روز ۱۲ ژانویه و مقایسه آن در سطح زمین با تراز ۷۰۰ هکتوپاسکال و کمتر شدن آن در لایه میانی (تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال) جو منطقه، نشان از وجود هوای ناپایداری است. مقایسه پارامترهای دما، نسبت آمیزه و دمای پتانسیل در روزهای ۷ و ۱۲ ژانویه و حتی در روزهای دیگر این دوره بارشی در سطح زمین و ترازهای ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال نشان می‌دهد که توده هوای غالب براین استان از نوع حاره‌ای دریایی (mT) است.




نگاره ۲: نقشه سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ روز ۷ ژانویه ۲۰۰۴

## فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (۲۸)

بررسی و تحلیل همدید - دینامیک ریزش برف ... / ۳۱


در نقشه رودباد این روز کوران شدیدی از شمال شرق افریقا تا نواحی غربی شمال ایران قرار داشته و تندي آن به بیش از ۱۲۰ تات (۶۰ متر بر ثانیه) می‌رسد. (نگاره ۵).



نگاره ۵: نقشه رودباد در ساعت صفر گرینویچ روز ۷ ژانویه ۲۰۰۴


جريان‌های جوی حاکم بر منطقه در روز ۸ ژانویه نقشه‌های سطح زمین این روز نشان دهنده تقویت کم فشار سطح زمین (۱۰۰۰ هکتوپاسکال) و گسترش آن بر روی کشور است. در ترازهای ۸۵۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال ضمن تقویت مرکز کم ارتفاع مذکور به سمت شرق نیز گسترش یافته و پریندهای کشیده شده بر روی کشورمان را کمی از حالت مداری خارج کرده و حالت جنوبی تر یافته است که نشان از حرکت سریع تر و باز شدن تدریجی مراکز کم ارتفاع مزبور می‌باشد. در نقشه رودباد این روز نیز تقریباً همان شرایط روز قبل حاکم است. تنها محور ناوه کمی به طرف شرق منتقل شده است.

در نقشه وزش رطوبتی تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال این روز بر روی نواحی جنوب شرق ایران، دریای عمان و شرق عربستان یک حرکت واچرخندی بسیاری خوبی مشاهده می‌شود که این شرایط باعث تغذیه خوب رطوبت و گرما به درون سامانه‌های کم فشار شرق مدیترانه و تقویت آنها شده است.




نگاره ۳: نقشه تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر گرینویچ روز ۷ ژانویه ۲۰۰۴

در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال، این کم ارتفاع به صورت ۵۲۴ بسته و با همان مکان و محور قائم و با مرکز ۵۸۰ ژئوپتانسیل دکامتر دیده می‌شود. پریندهای ۵۵۲ الی ۵۸۸ ژئوپتانسیل بر روی ایران کشیده شده اند. وجود پر ارتفاع ۵۸۸ دکامتر بر روی عربستان سبب شده که پشتیه ضعیفی در نواحی غربی ایران دیده شود. (نگاره ۴) در ساعت ۱۲ همین روز جريان‌های جنوبی و جنوب غربی بر روی ایران دیده می‌شود.




نگاره ۴: نقشه تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر گرینویچ روز ۷ ژانویه ۲۰۰۴

بيانگر حرکت سامانه مذکور، به سمت شرق و تضعیف آن است. به طوری که کم فشار ۱۰۰۵ هکتوپاسکال بر روی دریای خزر و زبانه پر فشار ۱۰۲۰ هکتوپاسکال ناشی از عرض‌های بالاتر از سمت شمال غرب همراه با نفوذ هوای سرد می‌باشد. بر روی نواحی جنوبی ایران نیز کم فشار ۱۰۰۰ هکتوپاسکال حاکم است (نگاره ۷).




نگاره ۷: نقشه سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ روز ۹ ژانویه ۲۰۰۴



نگاره ۸: نقشه تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر گرینویچ روز ۹ ژانویه ۲۰۰۴

در نقشه تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال دیده می‌شود که در نواحی شمال و شمال غرب ایران همراه با ریزش هوای سرد و نواحی جنوبی کشور فرارت هوای گرم است (نگاره ۸).

در نقشه چرخندگی روز ۸ ژانویه یک چرخندگی مثبت یا سیکلونی در شرق مدیترانه و غرب ایران و چرخندگی منفی یا آنتی سیکلونی در نواحی جنوب شرق ایران و شرق عربستان دیده می‌شود که این شرایط منطبق بر استقرار سامانه‌های کم فشار و پر فشار در منطقه است. در نقشه امگای تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال روز ۸ ژانویه نیز به خوبی وجود دو هسته صعودی (امگای منفی) در شرق مدیترانه (غرب ایران) و جنوب عربستان دیده می‌شود که این شرایط نیز به خوبی جریان‌های صعودی و ناپایداری جو این مناطق را نشان می‌دهد. نمودار اسکیوتوی این روز نیز نشان می‌دهد که در سطوح پایین و میانی جو منطقه نیمرخ دما و رطوبت به هم نزدیک شده و نشانگر ناپایداری هوا و وجود رطوبت کافی در این روز و در این سطوح جو استان یزد است (نگاره ۶).



نگاره ۶: نمودار اسکیوتوی روز ۸ ژانویه ۲۰۰۴ ایستگاه جو بالا در منطقه

در این روز در بیشتر ایستگاه‌های استان بارش‌های شدیدی بوقوع پیوسته به طوری که در ایستگاه‌های منشاء، باگستان، بند پایین، تنگ چنار، بردستان، ده بالا، ده چاه، بیداخوید، دامک و فخر آباد به ترتیب ۵۳، ۳۰، ۳۸/۵، ۲۴/۷، ۳۸، ۲۰، ۴۷، ۲۵، ۱۸ و ۲۶ میلیمتر بارش و در ارتفاعات استان از جمله مناطق تفت، ده بالا، نیر، بیداخوید، و بردستان بارش برف گزارش شده است.

**جریان‌های جوی حاکم بر منطقه در روز ۹ ژانویه**  
بررسی نقشه‌های سطح زمین تا سطوح فوکانی این روز

### جريان جوی حاکم بر منطقه در روز ۱۰ ژانویه

در این روز همچنان حاکمیت استقرار سلول‌های کم فشار ۱۰۰۵ و ۱۰۱۰ هکتوپاسکال در تمام مناطق کشور است. در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال نیز کم ارتفاع بسته ۱۳۶ ژئوپتانسیل دکامتر در شمال دریای خزر بسته شده که زبانه‌های آن نواحی شمالی ایران تحت تأثیر خود قرار داده است و پر ارتفاع ۱۵۶ ژئوپتانسیل دکامتر نیز در جنوب شرق ایران، شرق عربستان و دریای عمان مستقر است. در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال نیز پربندهای ۵۴۴ الی ۵۸۴ ژئوپتانسیل بر روی ایران گستردۀ شده است. وضعیت نقشه‌های امگا، وزش رطوبتی و چرخندگی همانند روزهای قبل بوده با این تفاوت که ناپایداری‌ها به طرف شرق و منطقه مورد مطالعه کشیده شده است.


### جريان‌های جوی حاکم بر منطقه در روزهای ۱۱ الی ۱۴ ژانویه

بررسی نقشه سطح زمین در روز ۱۱ ژانویه حاکی از نفوذ پرفشار ۱۰۲۰ هکتوپاسکال از عرض‌های بالا به همراه هوای سرد در نیمه جنوبی کشور است. در شرق شبیه جزیره عربستان و ایران نیز مراکز کم فشار ۱۰۰۰ و ۱۰۰۵ هکتوپاسکال دیده می‌شود. این در حالی است که در ترازهای فوقانی پسته ضعیفی در غرب کشور مشاهده می‌شود.


در روز ۱۲ ژانویه در نقشه سطح زمین نفوذ هوای سرد به همراه زبانه پرفشار ۱۰۲۰ هکتوپاسکال در شمال غرب و شمال شرق دیده می‌شود. در مقابل مراکز کم فشار شرق مدیترانه و شبیه جزیره عربستان با هم ترکیب شده و از ترکیه تا نواحی شرق مدیترانه و شبیه جزیره عربستان را در برگرفته اند.

در سطوح فوقانی نیز ناوه شرق مدیترانه ضمن عمیق تر شدن به سمت شرق منتقل شده و گرادیان شدید ارتفاعی بر روی آن‌ها به خوبی مشاهده می‌شود. در روزهای بعد تا ۱۴ ژانویه این سامانه ترکیبی مدیترانه‌ای و سودانی به

در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال محور ناوه شرق مدیترانه (۵۳۲ ژئوپتانسیل دکامتر) کمی به طرف شرق منتقل شده است (نگاره ۹). همین وضعیت در نقشه تراز رودباد این روز نیز دیده می‌شود و منطقه کوران شدید و گسترده‌ای با سرعت بیش از ۵۵ متر بر ثانیه از دریای سرخ، عربستان تا نواحی مرکزی و شمالی ایران را در بر گرفته است (نگاره ۱۰).




نگاره ۹: نقشه تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر گرینویچ روز ۹ ژانویه ۲۰۰۴



نگاره ۱۰: نقشه رودباد در ساعت صفر گرینویچ ۹ ژانویه ۲۰۰۴

می شود که منحنی های هم فشار ۱۰۱۵ تا ۱۰۳۵ هکتوپاسکال آن تا نواحی شمالی و غربی ایران امتداد می یابد. در مناطق مرکزی و جنوبی ایران کم فشار ۱۰۱۰ هکتوپاسکال مشاهده می شود که هم فشار ۱۰۱۵ هکتوپاسکال آن از نواحی خلیج فارس، غرب، مرکز و شرق ایران عبور می کند. پرفشاری که در شرق عربستان قرار دارد، می تواند با حرکت واخرخندی خود رطوبت و گرما را به درون کم فشار مذکور تغذیه کرده و آن را تقویت کند. (نگاره ۱۱).



نگاره ۱۱: نقشه سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ روز ۶ ژانویه ۲۰۰۸

فعالیت هم زمان دو سامانه پرفشار شمالی و کم فشار جنوبی ایران باعث می شود تا هم شاهد وزش هوای سرد از عرض های شمالی و هم ریزش بارش و برف در مناطق مرکزی و جنوبی باشیم. در این روز در برخی از مناطق استان از جمله یزد، میبد، عقدا، بافق، مروست، ریاط پشت بادام و طبس به ترتیب ۳، ۵، ۵/۸، ۱/۹، ۹/۳، ۱/۲ و ۷/۲ سانتیمتر برف گزارش شده است. در ساعت صفر گرینویچ همین روز در نقشه سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال مرکز پر ارتفاع روئیه بر روی شمال ایران و مرکز کم ارتفاع ۱۴۸ ژئوپتانسیل دکامتر در نوچی غربی تا مرکز ایران دیده می شود. در این ساعت و ۱۲ ساعت بعد مرکز کم ارتفاع مذکور (۱۴۰ دکامتر) کاملاً بر روی ایران استقرار می یابد که توسط پر ارتفاع شرق عربستان تقویت می شود. (نگاره ۱۲).

طرف شرق و شمال شرق حرکت کرده و ایران را به مدت چند روز تحت تهاجم خود قرار داده است و سبب برف و بارش های زیادی در استان یزد و مناطق مرکزی ایران شده است. در این دوره بارشی در ایستگاه های فیض آباد ۵/۵، علیقلی بردستان ۱۴۳، منشاد و کرخنگان ۱۵۹، ده بالا ۱۲۹/۶، طبس ۳۵/۵، فخرآباد ۴۴/۵، طریجان ۹۶ میلیمتر بارش و در مناطق ده بالا، نفت، نیر و سخوید، بیداخوید و ارتفاعات استان ریزش برف گزارش شده است.

### الگوی دوم

علت اصلی ریزش برف در این الگو، استقرار چند روزه پرفشاری بر روی شمال کشور و روئیه بوده که با حرکت واخرخندی خود به طور مرتب هوای سرد عرض های بالا را به طرف ایران منتقل کرده و با ایجاد پدیده بلوکینگ موجب ماندگاری هوای سرد به مدت چند روز در ایران و منطقه مورد مطالعه می شود. همچنین ناوه عمیق کم فشار شرق مدیترانه و دریای سرخ بر روی ایران و استان فعالیت کرده و فعالیت هم زمان این دو توده هوای جبهه ای به مدت چند روز موجب ریزش برف و سرمای شدید در ایران و استان یزد می شود. نمونه خوب این الگو در دوره برفی روزهای ۶ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ تحلیل می شود.

از ویژگی های مهم این دوره بارشی غلبه سرمای شدید و ایجاد یخبندان بر ایران مرکزی و استان یزد است. در طی این دوره دمای بیشتر ایستگاه های استان به زیر صفر درجه سلسیوس رسید. در برخی ایستگاه ها کاهش دما در این دوره به حدود ۱۸ درجه سلسیوس رسید. دمای حداقل مطلق ایستگاه های نصرآباد، بهباد و ده بالا به ۱۷- درجه سلسیوس رسید.


### جریان های جوی حاکم بر استان یزد در روز ۶ ژانویه ۲۰۰۸


در ساعت صفر گرینویچ در نقشه سطح زمین این روز مرکز پرفشار ۱۰۴۰ هکتوپاسکال بر روی روئیه دیده

## فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (۲۸)

بررسی و تحلیل همدید - دینامیک ریزش برف ... / ۳۵

مرکز کم ارتفاع و ناوه ۱۴۰ دکامتر بر روی نواحی مرکزی و شرقی ایران دیده می شود که منحنی های هم ارتفاع ۱۴۴ و ۱۴۸ دکامتر آن تمام ایران را پوشش می دهد. در نواحی شمالی ایران مرکز پر ارتفاع ۱۵۶ ژئوپتانسیل دکامتر در روسیه بسته شده و پر ارتفاع ۱۶۰ ژئوپتانسیل دکامتر نیز بر روی اروپا دیده می شود که پشتہ ۱۵۲ دکامتر آن تا شرق مدیترانه، دریای سرخ و غرب عربستان امتداد می یابد (نگاره ۱۴).






نگاره ۱۷: نمودار اسکیوتویی روز ۷ ژانویه ۲۰۰۸ ایستگاه جو بالا در منطقه

### جریان‌های جوی حاکم بر استان یزد در روزهای ۸ و ۹ ژانویه


نقشه سطح زمین این روز حاکم از ادامه فعالیت کم فشار شرق ایران است (نگاره ۱۸) بوده که در ساعت‌های دیگر از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود. وجود پرسنل شمال کشور باعث ریزش هوای سرد و ریزش برف و ادامه سرما در استان است. ارتفاع برف در ایستگاه بید اخوید ۸ سانتیمتر گزارش شده است.




نگاره ۱۸: نقشه سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ روز ۸ ژانویه ۲۰۰۸

در ساعت صفر گرینویچ در نقشه تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال نیز دیده می‌شود که کم ارتفاع روی ایران از کشور خارج شده

و نشانگر ناپایداری هوا و وجود رطوبت خوب در این روز و در این سطوح است (نگاره ۱۷). باد در سطوح پایین جو، جنوب غربی و در بالای جو به صورت غربی می‌وزد. بررسی سطوح مختلف جو استان در روز ۷ ژانویه نشان از ناپایداری هواست. شاخص ناپایداری Si در ایستگاه یزد ۳ و هوای ناپایدار را نشان می‌دهد دما در تراز ۷۰۰ هکتوپاسکال ۱۵- درجه سلسیوس و نسبت آمیزه  $1/2$  گرم بر کیلوگرم بوده که این شرایط حضور توده هوای mA در استان یزد است.



نگاره ۱۵: نقشه سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر گرینویچ روز ۷ ژانویه ۲۰۰۸



نگاره ۱۶: نقشه امگای تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر روز ۷ ژانویه ۲۰۰۸

فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (میر)

بررسی و تحلیل همدید - دینامیک ریزش برف ... / ۳۷

را نشان می دهد (نگاره ۲۰). در این روز سامانه مؤثر بر ایران در حال عبور از شرق کشور است ولی همچنان ادامه سرما در استان گزارش شده و ناپایداری های جوی به شرق کشور کشیده شده است.

در روز ۹ ژانویه در نقشه سطح زمین دیده می‌شود که غیر از پرسنل روسیه، پرسنل دیگری در شمال شرق کشور ایجاد شده که در ۱۲ ساعت بعد این دو با هم ترکیب شده‌اند. در نقشه تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال در شرق دریای خزر کم ارتفاع ۱۴۰ دکامتر فعال است و در نقشه ۵۰۰ هکتوپاسکال نیز همچنان در شمال ایران پر ارتفاع روسیه (۵۲۲ دکامتر) فعال بوده و باعث ادامه سرما در کشور و منطقه است.

در روزهای ۱۰ و ۱۱ زانویه در جنوب غرب دریاچه سرخ کم فشار دیگری تشکیل شده و در شمال کشور پرفشار روسیه به طرف ایران جابه جا شده و این شرایط مناسبی را برای ادامه برف و سرما به ویژه در ارتفاعات استان یزد موجب شده است.

الگوی سوم


در این الگو، استقرار و نفوذ پرسنل شماره دریای خزر و سیری و تشکیل و استقرار چند روزه پدیده کم فشار برپا شده یا سردچال گستردگی در نواحی شمالی و مرکزی ایران بوده است که شاخه جنوبی سامانه های ناپایدار آن با تغذیه مناسب رطوبت و گرما از آب های جنوبی کشور باعث ریزش برف و باران در مناطق مرکزی و استان یزد شده است. نمونه خوب این الگو در دوره برفی روزهای ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۰۹ می شود.

## ۲۹ جریان‌های جوّی حاکم بر استان یزد در روز


نومبر ۲۰۰۹

در نقشه سطح زمین این روز در شمال دریای خزر مرکز پرفشار ۱۰۳۰ هکتوپاسکال مشاهده می‌شود. این پرفشار سطح گسترده‌ای از ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و هم فشار ۱۰۲۰ هکتوپاسکال آن تا مرکز کشور

و همانند روزهای گذشته پر ارتفاع روسیه (۱۵۲ دکامتر) هنوز در حال فعالیت است و هم ارتفاع ۱۴۸ دکامتر آن نیمه شمالی کشور را متأثر کرده است. در نقشه تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال این روز مشاهده می شود که پر ارتفاع ۵۵۲ دکامتر روسیه در شمال دریای خزر مستقر شده است و پشتی ۵۴۸ دکامتر نیز در شمال شرق آفریقا قرار گرفته است (نگاره ۱۹).




نگاره ۱۹: نقشه تراز ۵۰۰ هکتار پاسکال در ساعت صفر  
گرینویچ روز ۸ زانویه ۲۰۰۸



## نگاره ۲۰: نقشه امگای ۸۵۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر روز ۸ ژانویه ۲۰۰۸

نقشه امگای تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال این روز پایداری  
هوا در منطقه مورد مطالعه و غرب ایران (مقادیر مثبت امگا)

یک سیستم مانع در مسیر حرکت ناوه بادهای غربی در شرق مدیترانه قرار دارد و آن را به دو شاخه شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. شاخه جنوبی آن از دریای سرخ و عربستان عبور می‌کند (نگاره ۲۲).



نگاره ۲۳: نقشه سطح زمین در ساعت گرینویچ صفر گرینویچ روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹


جريان‌های حاکم بر استان یزد در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹

در این روز با نفوذ بیشتر کم فشار مستقر در جنوب غرب ایران، پرفشار ۱۰۳۰ هکتوپاسکال روز قبل به طرف شمال کشور عقب نشینی کرده و با ریزش هوای سرد شرایط را برای نفوذ بیشتر و ایجاد بارش‌های جنوب و مرکز کشور و منطقه مورد مطالعه فراهم نموده است (نگاره ۲۳).


در همین زمان در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال این روز ناوه عمیق شرق مدیترانه تا نواحی غرب ایران کشیده شده است و شاخه جنوبی آن پس از عبور از آبهای جنوبی کشور از سمت جنوب و جنوب غرب وارد ایران شده است (نگاره ۲۴).

در نقشه وزش رطوبتی این روز در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال بر روی جنوب شبه جزیره عربستان یک حرکت واچرخنده دیده می‌شود که باعث تغذیه گرما و رطوبت به درون کم فشار مستقر در جنوب کشور و مرکز عربستان شده است. (نگاره ۲۵).

و استان یزد امتداد می‌یابد. وجود همین پرفشار سبب شده تا جريان‌های جنوبی نتوانند وارد کشور شوند. بنابراین اکثر نواحی کشور از هوای پایدار برخوردار است. در این روز در جنوب دریای سرخ کم فشار ۱۰۱۰ هکتوپاسکال دیده می‌شود که هم فشار ۱۰۱۵ هکتوپاسکال آن تا جنوب غرب کشور کشیده شده است (نگاره ۲۱).



نگاره ۲۱: نقشه سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ روز ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹



نگاره ۲۲: نقشه سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹


در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال این روز مرکز کم ارتفاع ۵۶۰ رئوپتانسیل دکامتر در غرب کشور مشاهده می‌شود که مانند

## فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (۲۷)


بررسی و تحلیل همدید - دینامیک ریزش برف ... / ۳۹

کشور عراق دیده می شود (نگاره ۲۷) که هنوز به طور کامل به استان و منطقه نرسیده است.


نمودار اسکیوتوی این روز نیز نشان از ناپایداری هوا و وجود رطوبت کافی در این روز و در این منطقه است (نگاره ۲۸). شاخص های ناپایداری Si برابر صفر و  $Ki = 25$  را در این روز نشان می دهند که هر دو نشان از ناپایداری های شدید جو استان یزد هستند.




نگاره ۲۶: نقشه امگای سطح زمین در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ (pascal/s)



نگاره ۲۷: نقشه چرخندگی تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹



نگاره ۲۴: نقشه تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در ساعت صفر گرینویج روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹



نگاره ۲۵: نقشه وزش رطوبتی سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال در روز ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ (gr/kg)

در نقشه امگای سطح زمین این روز در غرب منطقه مورد مطالعه ناپایداری و یک هسته صعود در جنوب عربستان دیده می شود. این نقشه از پدیده سردچال پیروی می کند. در ضلع شرقی سردچال و در طول ۵۰ درجه شرقی یک هسته صعود دیده می شود (نگاره ۲۶).

در نقشه چرخندگی این روز نیز یک چرخندگی مشتبه سیکلونی در نواحی شرق دریای سرخ، غرب خلیج فارس و


و شمالی کشور امتداد یافته است. شاخص‌های ناپایداری Si عدد ۲ و Ki عدد ۳۶ (ناپایداری شدید) در منطقه را نشان می‌دهند.

در روزهای ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۰۹ با تشکیل پشته عمیقی در غرب کشور، ناوه مستقر در مرکز ایران و استان یزد نیز عمیق‌تر شده و سردهجال روز قبل بیشتر بخش‌های کشور را فرا گرفته است و شاخه جنوبی آن با تغذیه مناسب رطوبت از آب‌های جنوبی کشور، سبب ادامه ناپایداری‌ها و بارش‌های برف و باران قابل توجه در مناطق مرکزی و استان یزد شده است. در روزهای بعد این پدیده به سمت شرق کشور تغییر مکان داده ولی همچنان شرایط را برای حضور هوای سرد و ادامه ریزش برف و باران در منطقه مورد مطالعه فراهم کرده است. در این دوره بارشی به مدت ۳۶ ساعت ریزش برف در بیشتر مناطق استان از جمله در مناطق خضرآباد و نصرآباد به ترتیب ۳۰ و ۴۰ و در ارتفاعات استان یزد بیش از ۸۰ سانتی متر و افت شدید دما گزارش شده است. همچنین موجب آب گرفتگی در شهر یزد و تعطیلی مدارس در مناطق ده بالا، طربرجان و علی آباد گردیده است.

### نتیجه‌گیری

با بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ۱۲ سامانه برف و بارش زا در طول دوره آماری در استان یزد، سه الگوی همدید و فشاری زیر استخراج می‌شود:

در الگوی اول ضمن نفوذ هوای سرد از عرض‌های بالا، کم فشارهای واقع در شرق مدیترانه و عربستان با هم ترکیب شده و ضمن عمیق‌تر شدن ناوه شرق مدیترانه و حرکت شرق سوی آن، ایران و استان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در روزهای بعد نیز نفوذ هوای سرد به همراه زبانه‌های پرفشار در نیمه شمالی ایران و تشکیل مراکز کم فشار مناسب شرق مدیترانه و سودانی و ترکیب آن‌ها سبب استقرار چند روزه این سامانه‌ها بر روی ایران و استان یزد و ریزش برف و بارش‌های قابل توجهی به ویژه در ارتفاعات این استان شده است.



نگاره ۲۸: نمودار اسکیوتی ۳۰ نوامبر ۲۰۰۹ ایستگاه جو بالا در منطقه

جریان‌های حاکم بر کشور در روز اول دسامبر ۲۰۰۹ در نقشه سطح زمین این روز، پرفشار مستقر در شمال خزر و روسیه به علت همراهی یک پشته در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال تقویت شده (۱۰۴۵ هکتوپاسکال) و زیانه‌های آن (ریزش هوای سرد) تا مناطق مرکزی و غرب کشور امتداد می‌یابد. وجود سردهجال باعث حرکت آهسته کم فشارهای جنوبی و جنوب غربی ایران شده و نیز استقرار کم فشار ۱۰۱۵ هکتوپاسکال در مرکز ایران باعث ادامه بارش‌های قابل توجهی در استان یزد شده است.

در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال این روز مرکز کم ارتفاع غرب ایران در روز قبل از منشأ خود جدا شده و به صورت یک سردهجال (کم فشار بریده) در آمده است که به تدریج به داخل و مرکز کشور پیشروی کرده است.

در نقشه وزش رطوبتی این روز نیز دیده می‌شود که واچرخند مستقر در روی عربستان با حرکت به سمت شرق و عبور از آب‌های جنوبی کشور، رطوبت و گرمای را به درون کم فشار مستقر در جنوب ایران تغذیه می‌کند. در نقشه امگای روز قبل، هسته صعودی واقع در طول ۵۰ درجه شرقی به سمت جنوب شرق کشور جابه جا شده و تا نواحی مرکزی

## فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (۲۸۰)

بررسی و تحلیل همدید - دینامیک ریزش برف ... / ۴۱

### منابع و مأخذ

- ۱- پدرام، مژده (۱۳۷۵). الگوی سینوپتیکی پیش بینی برف در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی به راهنمایی هوشینگ قائمی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
- ۲- پروانه، شیراوند و درگاهیان؛ بهروز، هنگامه و فاطمه (۱۳۸۹)، بررسی الگوهای سینوپتیکی روزانه بارش برف سنگین در غرب ایران، همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، ۵ و ۶ خرداد، خرم اباد، صص ۴۰-۱.
- ۳- درگاهیان و علیجانی؛ فاطمه و بهلول (۱۳۹۲)، بررسی اثر بلوکینگ بر رخداد برفهای سنگین و مداوم ایران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره ۳۸، صص ۱۴-۱.
- ۴- سازمان هواشناسی کشور (۱۳۸۷). طرح پژوهشی بررسی الگوهای سینوپتیکی بارش‌های برف سنگین در غرب و جنوب غرب ایران، مجری طرح هنگامه شیراوند، صص ۲۱۶-۲۱۳.
- ۵- شکیبا، آمنه (۱۳۹۲)، تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش برف سنگین در شمال غرب ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی به راهنمایی سلیمان صادقی، دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۶- صفری، و صلاحی، هدیه و برومند (۱۳۸۹)، تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش‌های برف سنگین شهرستان کرمانشاه، پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست، تهران، صص ۱۵-۱.
- ۷- علیجانی و کاویانی؛ بهلول و محمدرضا (۱۳۸۲). مبانی آب و هوا شناسی، تهران، انتشارات سمت، صص ۲۶۱-۲۶۲.
- ۸- غیور، کاویانی، محسنی؛ حسنعلی، محمدرضا و بهرام؛ (۱۳۸۳). برآورد سطح پوشش و مقدار ریزش برف در ارتفاعات شمال تهران، مطالعه موردي: حوضه رودخانه تجریش، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۷۵، صص ۱۵-۳۳.
- ۹- فهیمی نژاد، حجازی زاده، علیجانی، رضائیان؛ الهام، زهرا، بهلول و پرویز (۱۳۹۱). تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف در استان گیلان (فوریه ۲۰۰۵). جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره ۱۹، صص ۲۸۱-۳۰۲.

در الگوی دوم به علت استقرار چند روزه پرفشاری برف روی شمال کشور و روسیه و با حرکت واچرخندی خود به طور مرتب هوای سرد عرض‌های بالا را به طرف ایران هدایت کرده و با ایجاد پدیده بلوکینگ موجب ماندگاری هوای سرد به مدت چند روز در ایران و منطقه مورد مطالعه می‌شود. همچنین ناوه عمیق کم فشار شرق مدیترانه و دریای سرخ بر روی ایران و استان فعالیت کرده و فعالیت هم زمان این دو توده هوای جبهه‌ای به مدت چند روز موجب ریزش برف و سرمای شدید در ایران و استان یزد می‌شود.

علت اصلی ریزش برف در الگوی سوم در استان، استقرار و نفوذ پرفشار شمال دریای خزر و سیبری و تشکیل گسترهای ای در نواحی شمالی و مرکزی ایران بوده است که شاخه جنوبی سامانه‌های ناپایدار آن با تغذیه مناسب رطوبت و گرما از آب‌های جنوبی کشور باعث ریزش برف و باران در مناطق مرکزی و استان یزد شده است.

لازم به یادآوری است با توجه به رخداد کم بارش برف در استان یزد تا به حال مطالعه ای آن هم جامع درباره تحلیل همدید- دینامیک از همه دوره‌های بارش برف در این استان انجام نشده است. در این تحقیق تمام دوره‌های ریزش برف استان در طول دوره آماری مورد نظر تحلیل شده و از نظر ساز و کار و علل ایجاد، الگوهای همدید- دینامیک آنها استخراج گردیده است که چنین مطالعه ای بدین شکل تا به حال در استان یزد صورت نپذیرفته که از نوآوری برخوردار است.

### پیشنهادات

- جهت مدیریت بهینه منابع آب، در ارتفاعات مختلف و بلند استان یزد ایستگاه‌های برف سنجی احداث شود.
- تجهیز ایستگاه‌های برف سنجی به برف سنج‌های الکتریکی جهت دسترسی به آمار دقیق برف به منظور مطالعات کامل تر درباره منابع آب در این استان.
- اندازه‌گیری مداوم و به موقع ایستگاه جو بالای همدید یزد در ساعت صفر و ۱۲ گرینویچ.

- States, National Meteorology Center, Nov,pp 663-667.
- 21- Younkin. R.J. (1968). Circulation Pattern associated With heavy Snow fall over the Western United States. Monthly Weather Review 96: pp 851-853.
- 10- فرید مجتهدی، خوش اخلاق، نیری و افشار منش ؛ نیما، فرامرز ، معصومه و حمیده (۱۳۸۵)، واکاوی همدیدی رخداد بارش برف سنگین فوریه ۲۰۰۵ استان گیلان، مجله علوم جغرافیایی، شماره ۴، صص ۱۳۳-۱۵۶.
- 11- کاویانی، محمد رضا (۱۳۸۶)، میکروکلیماتولوژی، انتشارات سمت، تهران، ۳۳۷ صفحه.
- 12- Amininia. k, Lashkari. H, Aljani. B and Khorshiddoust. AM. (2010), Analysis and Review of heavy snow synoptic conditions in North West of Iran by Using PCA and Clustering, J. Int. Environmental Application Science, Vol. 5(1): pp17-24.
- 13- Baker. P ,Charls.E and Kornard.IT (2004) .Northwest flow snowfall in the southern Appalachian:Spatial and synoptic patterns, 61st Eastern Snow Conf, Portland, Maine,USA.pp 179-189.
- 14- Boyden, C.J, (1964). A Comparison of snow predictors. Mete. Mag., London, 93. Pp 353-365.
- 15- Brain. P ,Patrick.S,Market.A and Paul.R (2004). A case study of a rare sever thunderstorm with snowfall, National Weather Service.Department of Soil,Environmental and Atmospheric Sciences pp 1-5.
- 16- Birkeland. KW and Mock. CJ (1996). Atmospheric circulation patterns associated with heavy Snow fall events, Bridger Bowl, Montanam U.S.A. Mountain Research and Development. Vol 16,NO3 PP 281-286.
- 17- Conrad .P and Kenneth.S (2004). The heavy snowstorm of March 18-19 , 1956,The climax of a record late-season snow accumulation in southern New England, Monthly Weather Review, Mrch 1956.pp 116-125.
- 18- Daniail. PJ and Jeam.PA (2001). Characteristic of upslope snowfall event in northern New York and northern Vermont: Diagnostic and model simulation of several northwest-flow cases , Department of Earth and Atmospheric Sciences,pp 1-9.
- 19- Esteban,P Jones.PD,Martin.J and Masem.M (2005). Atmosphere circulation patterns related to heavy snowfall days in Andorra, Pyrenees, International Journal of Climatology, No 25, pp 319-329.
- 20- Paul. AG and Russel.JY (1996). Synoptic climatology of heavy snowfall over the central and eastern United